

HF

F o r e l e s n i n g a r

i

H E R B O L O G I

I. U G R A S O G U G R A S B I O L O G I

a v

T o r s t e i n V i d m e

LANDBRUKSBOKHANDELEN / UNIVERSITETSFORLAGET
AS/NLH/OSLO
1972

F o r e l e s n i n g a r

i

H E R B O L O G I

L. U G R A S O G U G R A S B I O L O G I

av

T o r s t e i n V i d m e

LANDBRUKSBOKHANDELEN/UNIVERSITETSFORLAGET
AS/NLH/OSLO
1972

I N N H A L D S L I S T E

<u>Generell innføring</u>	1
Definisjon av omgrepene ugras	1
Opphavet til våre ugrasarter	3
Frøproduksjonsevna hos ugraset	6
Spiringsbiologien hos ugraset	7
Spiredjupna for ugrasfrøet	9
Levetida for ugrasfrøet	10
Vegetativ formeiring hos ugras	12
Spreiing av ugrasfrø	13
Skaden ugraset gjer	15
<u>Biologiske ugrasgrupper</u>	17
Sommareittårige ugras	17
Vintereittårige ugras	17
Toårige ugras	18
Fleirårige stadbundne ugras	18
Fleirårige vandrande ugras	19
<u>Ugrasarter</u>	20
I. Sommareittårige ugras	20
Mindre viktige sommareittårige ugras	35
II. Vintereittårige ugras	36
Mindre viktige vintereittårige ugras	43
III. Toårige ugras	44
Mindre viktige toårige ugras	46
IV. Fleirårige stadbundne ugras	48
a. Med trevlerot	48
b. Med rotstokk	50
c. Med pålerot	52
d. Med uekte rot	57
Mindre viktige fleirårige stadbundne ugras	58
V. Fleirårige vandrande ugras	60
a. Med krypande, rotstående stenglar	60
b. Med krypande jordstenglar	60
c. Med krypande formeiringsrøter	68
d. Med stengelknollar i jorda	72
e. Med vegetativ formeiring på ymse andre måtar ...	74
Mindre viktige fleirårige vandrande ugras	77

<u>Teinung</u>	79
<u>Giftige ugras</u>	80
<u>Ugrasliste.</u> Norske plantenamn	86
<u>Ugrasliste.</u> Latinske plantenamn	88

GENERELL INNFÖRING

Ugras er eit universelt problem

Ved alle slag plantedyrking på friland må ein føre ein stadig kamp mot ugras dersom det skal bli nok avling å hauste eller om ein vil ha no ka glede av grasplenar, blomsterbed o.l. Men ein møter og ugrasproblem ved dei fleste andre former for menneskeleg aktivitet utandørs.

Under og etter den siste krigen har vi hatt ei kolossal utvikling når det gjeld middel og metodar i ugrasstriden, spesielt når det gjeld kjemisk ugrastyning. Det er nedlagt meir forskningsarbeid på dette området i dei to siste ti-åra enn i hundre ti-år tidlegare. Biologi, motarbeiding og tyning av ugras er i dag godkjent som ei fullverdig vitskapsgrein, som m.a. også stadig fleire botanikarar kastar seg over. Tidlegare var ugras nærmast rekna som urørlege planter, som blei sett på med avsky av dei fleste "reine" botanikarar som helst ville arbeide med den naturlege vegetasjonen.

Ugrasforskrarar i ulike land driv i dag organisert samarbeid på nasjonalt, regionalt og internasjonalt plan, og det blir stadig halde ugraskonferansar og symposier for utveksling av resultat og idear, og diskusjon av problem. Dei to største organisasjonane på dette området er "Weed Science Society of America" som gjev ut tidsskriftet "Weed Science", og "European Weed Research Council" som gjev ut tidsskriftet "Weed Research".

EWRC har dessutan organisert fleire forskargrupper eller komitéar som skal arbeide med spesielle problem.

Definisjon av omgrepene ugras

Ja, kva er så ugras? Den beste definisjonen er kanskje kort og godt "uönska vegetasjon", d.v.s. alle planter som veks på stader der den som eig eller skal bruke vekseplassen ikkje ønskjer at dei skal vekse, fordi dei gjer eller kan gjera skade eller vere til ulempe på ein eller annan måte. Plantedyrkarane er sjeldan i tvil om kva slag planter dei vil kalle ugras. Det er i første rekkje dei ville planteartene som gror opp saman med det dei har sådd og planta og gjer skade ved å konkurrere med kulturvokstrane om veksefaktorane, slik at det blir mindre avling av dårlegare kvalitet trass i auka arbeid og kostnad til jordarbeiding, mekanisk og kjemisk reinhold, korn- og frørensing, frøkontroll m.m.

Ei kulturplante kan og reknast som ugras dersom ho veks på feil plass, t.d. som innblanding i visse andre kulturar. Når ein dyrker oljevokstrar som raps eller rybs, vil ein del frø drysse på jorda og kan spire opp neste år som ugras i kornåkeren t.d. Enda verre er det om ein får raps i kålrot eller rybs i nepeåkeren, da det er mest uråd å skilje dei ut ved tynninga.

Om ei plante skal sjåast på som ugras eller ikkje, er såleis heilt avhengig av kvar ho veks, og kva vekseplassen elles skal nyttast til. Lövetann t.d. blir av dei fleste rekna som eit notorisk ugras, iallfall når den veks i eit blomsterbed eller på ein grasplen, fordi den skjemmer vekseplassen. Lövetann i jordbæråkeren eller enga er og utvilsomt ugras, fordi ein får mindre jordbær og mindre höy. I beite derimot, vil iallfall hollandske og belgiske bønder gjerne ha litt lövetann, fordi den er mineralrik og like proteinrik som klöver, og beitedyra er glad i lövetann. Men tek den overhand, blir det for liten avkastning av beitet og ein må sprøyte.

Særleg i beitemark er det elles mange planter som må reknast som absolutte ugras, fordi dei er giftige, t.d. selsnepa, landøyda, dikesvineblom, myrsnelle, revebjölle, tyrihjelm m.fl. Ville laukarter og pengerurt kan setje lauksmak på mjölka. Andre plantearter i beitene er ugras fordi dyra vrakar dei av ein eller annan grunn, t.d. sòlvbunke og einstape. Vassplanter i opne grøfter og kanalar er ugras fordi dei hemmer vassstraumen, slik at det blir slamutfelling som til slutt tetter til avlaupet for røyngrøfter som kan setja heile grøftesystem på den tilgrensande kulturjorda ut av funksjon. Busker og kratt og annan hög vegetasjon på vegkantar kan hindre oversikt i svingar og bli årsak til ulukker. Det er elles tallause plassar som helst skal vere fri for vegetasjon, m.a. grustun, grusgangar, vegar, jarnvegar, industriområde, opplagstomter o.s.b. På slike plassar er alle plantearter ugras.

Til den eigentlege ugrasfloraen rekner vi alle dei ville planteartene som er meir eller mindre brysame i jordbruk, hagebruk og planteskular. Å kalle dei "ville" planter er kanskje ikkje heilt korrekt. Dei fleste er temmeleg "tamme" og mange ugrasarter vantar heilt i vår naturlege flora, og finst berre i kulturjord eller andre plassar der folk har rota i jorda. Dei er heilt avhengige av menneskeleg aktivitet for å kunne eksistere. "Kulturugras" ville kanskje høve betre på slike arter.

Av ikring 300.000 plantearter på jorda, er det relativt få som gjer seg gjeldande som ugras, men det er meir enn mange nok, og det finst ugras innan dei fleste og sjølv dei beste plantefamiliane, ja, kanskje særleg der, t.d. grasfamilien, krossblomstrane, skjermplantene og korgplantene. I vårt land har vi i alt ca. 240 plantearter som gjer seg gjeldande som ugras i jordbruk og hagebruk (løvetann er då rekna med som ei art). På lag 100 plantearter er vanleg ugras over større eller mindre deler av landet vårt.

Dei fleste ugras er urteplanter, men særleg i beitemark og på plantefelt i skog er dei og representert ved lyng, busker og lauvtre.

Opphavet til våre ugrasarter

Kva er så grunnen til at berre visse plantearter syner "kriminelle" anlegg og har utarta til å bli brysame ugras? Og kva er opphavet til våre ugrasarter, historisk og genetisk?

Det er sikkert nok at fenomenet ugras er skapt av mennesket, og at det oppstod straks ein tok til å dyrke planter i rein bestand. For dette er ikkje naturens orden. Den naturlege vegetasjonen er karakterisert ved plantesamfunn av ulike arter som delvis konkurrerer, men i første rekkje utfyller einannan når det gjeld å utnytte alt tilgjengeleg vatn og plantenæring i ulike djupner i jorda, og lys og luft i ulike høgder over jorda. Samansettningen av plantesamfunna varierer frå stad til stad alt eller jordart, råmetilhøve, topografi og klima, men i urørt natur har det innan kvart plantesamunn utvikla seg eit balanseforhold mellom artene, som held seg nokså konstant så lenge veksevilkåra ikkje blir vesentleg endra på nokon måte.

Ein talar i vår tid så mykje om at det er farleg å forstyrra balansen i naturen, men det er klart at all plantedyrking med rydding av skog over større areal, jordarbeiding, grøfting, kalking, gjødsling, såing, planting og hausting av oftast innførde foredla planteslag som dyrkast i rein bestand, er i høgste grad eit inngrep i balansen i planteriket. Ein balanse som naturen gjer det den kan for å gjenopprette. Mange kulturar dyrkast i rader med større eller mindre avstand. Mellom radene vil det, særleg i den første delen av veksetida, vere gode vilkår for spiring, vekst og utvikling av mange uønska plantearter.

Det er heller ikkje tvil om at dei mest brysame og mest utbreidde ugrasartene i dag er kulturprodukter som kan vere genetisk og biologisk forskjellig frå dei opphavlege artene dei nedstammer frå på same måten som kulturplantene.

Mekanisma som ligg bak denne utviklinga, er på den eine sida genetisk variasjon i plantepopulasjonen på grunn av mutasjonar, kryssing, allo-polyplodi, og på den andre sida eit naturleg eller automatisk utval.

Det er klart at dei ulike dyrkingsinngrep som jordarbeiding, gjødsling, såing og hausting gjennom mange tusen år, må ha vore med å forma eigenskapane hjå alle dei ville planteartene som har vakse saman med kulturplantene. Det er og utan vidare klart at dette naturlege, automatiske utvalet må ha gått i retning av arter og former som er særleg effektive som ugras.

Det er heller neppe tvil om at mange av våre ugrasarter, spesielt sommertettårige og vintertettårige arter (t.d. krossblomstrane), opphavleg er komne til landet sørfrå saman med kulturplanter som korn og lin m.fl., og at somme av dei kanskje har vore dyrka eller i alle fall nytta til mat i eldre tid. I Danmark har dei funne liket av ein "mosemann" frå jernalderen, som først var hengd og etterpå gravlagt i ei myr, slik at han var godt konservert. Det siste måltidet hans viste seg å vere samansett av bygg, linfrø og frø av Chenopodium album, Spergula arvensis, Polygonum lapathifolium og Polygonum convolvulus.

Dei fleste av våre ugrasarter finst også på dei Britiske øyane. Godwin, som har studert vegetasjonshistorie ved Det Kvartärgeologiske Institutt i Cambridge, er kome til det resultat at 27 fleirårige ugrasarter og 14 vintertettårige eller to-årige arter, dei fleste vanlege ugras også i vårt land, kan sporast tilbake til istida, medan det berre er Scleranthus annuus mellom dei sommertettårige artene som går så langt attende i tida.

Dei eldste funn av andre sommertettårige ugras skriv seg frå neolittisk tid eller seinare. Ein reknar med at den eldste plantedyrkinga skriv seg frå den yngre steinalderen.

At ugraset følgjer med plantedyrkinga som nissen på lasset, har vi gode døme på ved kolonisasjonen av Amerika, Australia og New Zealand. USA har til dømes fått over 60% av sine ugrasarter frå andre verdsluter,

dei fleste frå Europa. Ugrasfrøet har følgt med i såvarer, føremne, emballasje, pakkemateriale eller på andre måtar. Indianarane kallar Plantago major for "den kvite manns fotspor". Frø av denne ugrasarta kan og bokstaveleg talt spreie seg med føtene over mindre avstander i-allfall, fordi det er klistret når det er vått.

Plantedyrkarane sjølv må ta ansvaret for storparten av ugrasspreiinga, også frå land til land. Men botanikarane har også visse ugrasarter på samvetet. I vårt land har såleis Matricaria matricaroides spreidd seg frå den botaniske hagen på Tøyen i det siste hundreåret (1862), og Galinsoga parviflora er spreidd over heile Europa, opphavleg frå den botaniske hagen i Madrid i 1794.

Innførte plantearter kan ofte vise seg å bli mykje meir aggressive som ugras i det nye landet enn der dei opphavleg høyrer heime. Grunnen til dette meiner ein dels kan vere at veksevilkåra faktisk er betre på den nye staden, eller at det er betre vilkår for spreiing, men det viktigaste er kanskje at dei ofte da vantar sine naturlege konkurrentar og fiendar. Dessutan kan det på grunn av genetisk variasjon i populasjonen, særleg polyploidi og apomixis, skje eit naturleg utval av rasar eller økotyper som høver særleg godt for det nye miljøet. Eitt godt døme har vi i Hypericum perforatum, som i Europa over alt ikkje blir rekna som ugras. Men arten er innført til USA, Australia og Sør-Afrika, der den har vist seg å bli eit særleg vondarta ugras. Prikk-perikum kom til USA frå Europa i slutten av det førre hundreåret, og er no eit av dei mest utbreidde og skadelege ugras i dei naturlege beitemarkene i Rocky Mountains og tilgrensande statar, særleg i California. Planta er og litt giftig, i-allfall for storfe og sau (lysømfintleg). Dr. Pritchard ved The Nature Conservancy, London, har påvist at det har laga seg ein ny rase av denne planta i Amerika, som utmerkjer seg mellom anna ved større høgdevekst enn dei formene ein finn i Storbritannia.

Mot denne ugrasarta har dei i USA prøvd biologisk krigføring med godt resultat. I 1945 førde dei inn perikumbiller frå Australia, som opphavleg hadde fått dei frå Frankrike. Det er to arter, Chrysolina gemellata og Chrysolina hyperici som lever bette på perikum og ikkje rører andre plantearter. Billene, som er svært dårlege flygarar, blir først formeira opp i veksthus og sett ut i koloniar med ca. 5.000 biller pr. $10\text{-}15 \text{ m}^2$ med høveleg mellomrom. Billene gneg alle perikumplanter innan

rekkevidde snaue for blad og blomster. Dei legg eggja sine på nye perikumskot og larvene overvintrer. Det tek tre år før ein koloni har spreidd seg over eit område med radius 400-500 m, men da tek "snøballen" til å rulle. Dessutan kjem farmarane og samlar biller i bøttevis og set ut nye koloniar i perikumfengde beiter. Av eit "infested" areal på ikring 10 mill. dekar er no store område reinsa for perikum på denne måten.

Mellom eit hundretal ugrasarter er det sjølv sagt ein veldig variasjon i morfologiske og biologiske eigenskapar. Men det mest karakteristiske fellestrekk er vel at ugraset er særslig effektive planter når det gjeld å konkurrere med kulturplantene om plass, lys vatn og næring, og særleg når det gjeld å formeire, spreie seg og overleve ulaglege veksevilkår og direkte åtak med kjemiske og fysiske våpen. Prof. Jens Holmboe heldt i si tid eit kringkastingsforedrag under tittelen: "En representant for livskraften". Den aktuelle representanten var den gongen lövetann, men vi har minst eit halvt hundre andre ugrasarter som kunne vere verdige representantar til denne tittelen.

Frøproduksjonsevna hos ugraset

Blomsterplantene av ugrasartene utmerkjer seg ved ei fantastisk frøproduksjonsevne. Vi nyttar her det populære namnet "frø" utan omsyn til kva slag frukter det er tale om. Medan kornartene normalt produserer ikring 50 frø pr. plante, må ein hos dei fleste ugrasarter rekne med fleire tusen, ti tusen eller hundre tusen frø pr. plante. Prof. Korsmo har i den store boka "Ugras i nåtidens jordbruk" frøtal for dei fleste ugrasarter. Som døme kan nemnast lövetann 3.000, höymole 9.000, vassarve 15.000, groblad 21.500 og bælderbrå 34.000 frø pr. plante i middel når ugraset veks saman med kulturvokstrane, og opptil 700.000 for burot på særleg store planter. Ugrasplantene utmerkjer seg og ved sin store elastisitet, slik at frøtalet auker kolossalt med auka vekserom og betre tilgang på vatn og næring. Amerikanaren Stevens har utført frøteljingar i eit stort tal ugrasarter på middelstore velutvikla planter som hadde vakse utan nemnande konkurranse. Han fann jamt over mykje høgare tal enn Korsmo. I middeltal for 101 eittårige, 19 toårige og 61 fleirårige ugrasarter fann han etter tur 20.800, 26.600 og 16.600 frø pr. plante. Dette skulle vera nok for å visa kor uhorveleg frøproduksjons-⁴ evne ugraset har (Døme: $15.000^4 =$ over 300 frø pr. m^2 på alt fastland på jorda).

Spiringsbiologien hos ugrasfrøet

Eit interessant og overlag viktig, men enno ikkje tilstrekkeleg utforska kapittel, er spiringsbiologien hos ugrasfrøet. Frøet hos dei aller fleste ugrasarter er meir eller mindre spiretregt, eller dormant som ein seier, og spirer lite eller ikkje straks etter modninga. Dormansen kan vere primær, d.v.s. naturleg og arts-spesifikk, men kan og vere sekundær, d.v.s. indusert eller påtvinga ved ulike ytre påverknader.

Naturleg dormans kan dels kome av at frøet treng ei viss tid til ettermodning før det er spirefört, men ofte er frøskalet så tett at det hindrer både vassopptak og gassutveksling, slik som vi finn det hos hardt kløverfrø til dømes, medan andre frø kan inbibiere vatn og svelle, men likevel ikkje spire fordi koldioksyd ikkje slepp ut og oksygen inn til frøkjerna. Hos andre frø kan det vere spirehemmende stoff som kan sitje i frøskalet (testa) eller i fruktskalet (perikarp). Frø av denne typen, t.d. Sinapis arvensis og Viola tricolor spirer ikkje før det spirehemmende stoffet er vaska ut. Hos mange dormante ugrasfrø kan dormansen brytast ved å punktere frøskalet, t.d. ved å stikke det med ei nål. Dette er til dømes tilfelle med Avena fatua. Hos andre arter kan dormansen brytast ved kuldebehandling eller varierande temperatur, lysbehandling eller med visse kjemikal. Kaliumnitrat er mye brukt og gibberellin-syre er særleg aktiv. Somme dormante frø spirer når dei blir lagt i jord, men ikkje på filterpapir. Den dormans-brytande faktoren som verker på ei planteart, kan vere utan verknad på andre arter, og ofte må det ein viss kombinasjon av ulike faktorar til før frøet spirer.

CO_2 - og N-gass induserer dormans. Thurston har elles påvist at "støypt" ikkje-dormant frø av Avena ludoviciana blir dormant når det blir utsett for temperaturar over $24,5^{\circ}\text{C}$ (men ikkje for under 23°C). Dormansen kunne brytast ved å lagre frøet ved $4-7^{\circ}\text{C}$ eit tid.

Karakteristisk for dormansen hos ugrasfrøet er elles at den kan vere sterkt varierande, ikkje berre mellom ulike arter, men også hos same art. Sjølv for frø frå same plante, eller i allfall frø frå same populasjon, kan det vere ein del frø som kan spire straks etter modninga, medan ein større del spirer neste vår etter overvintring tørt eller i jord, medan ein annan del igjen kan bli liggjande i jorda i fleire år og først spire det tredje, det gjerde året eller enda seinare, sjølv om det ligg i høveleg djupn og har gode spirevilkår.

Brenchley og Warrington i Rothamsted la åkerjord i grunne forsøkskar i veksthuset, og talde opp ugrasartene som spirte med 6 vekers mellomrom. Etter kvar oppteljing rota dei jorda grundig igjennom, slik at det skulle bli gode spirevilkår. På denne måten heldt dei på i 10 år, og det var framleis enkelte arter som spirte opp i det 10. året, t.d. Polygonum aviculare og Aethusa synapium.

Dei mest omfattande studier av dormans hos ugrasfrø, er utført av Kolk i Sverige og Thurston i Rothamsted. Den siste har særleg arbeidd med Avena fatua og Avena ludoviciana, medan Kolk undersøkte 16 ulike tofrøblada ugrasarter som er vanlege i såfrø av engfrø. Han fann sterk dormans av minst 3 års varighet hos yassarve, åkersenne, haremata, balderbrå, grasstjerneblom, blåkoll og kveke, og av 1-3 års varighet hos åkerminneblom og krushøyemole. Svak dormans av 1-3 års varighet fann han hos smalkjempe, og frå 2 månader til 3 års varighet hos stormaure. Av dei 16 undersøkte artene, var det berre gaffelsmelle som mangla dormans fullstendig.

Hos Avena fatua fann Thurston at 95-100% av frøet er dormant ved modning, og at dormansen varer i 9-12 månader ved tørr lagring. Ho fann elles at ikkje-dormant floghavre spirer mest berre om våren, berre ein liten prosent av frøa spirer om hausten, medan Avena ludoviciana spirer mest berre om hausten og i vinterhalvåret, og er difor eit vanleg ugras i haustkorn i England, medan Avena fatua først og fremst finst i vårkorn og andre vårsådde grøder. Men den kan og finnast i haustkorn.

Dette at frøet hos ulike ugrasarter spirer til visse årstider, sjølv om det ikkje er dormant, er elles noko som er påvist av mange andre og, og er svært interessant med det at det viser at ugraset er tilpassa til visse grøder eller visse kulturinngrep i jord- og hagebruk. M.a. etter undersøkingar av Ingv. Petersen og Søren Lund i Danmark, viser det seg at dei aller fleste sommareittårige ugras spirer lite eller ikkje om hausten etter modninga, og om enkelte skulle spire så ville plantene som regel fryse ihel i løpet av vinteren. Desse ugrasartene finn ein difor først og fremst i alle slag vårsådde grøder der jorda blir arbeidd om våren. Mange av dei vintereittårige ugrasartene har derimot frø som kan spire både om våren og om hausten, og finst difor både i vårsådde og haustsådde grøder. Men det er stor skilnad på artene innan denne gruppa med omsyn til kor lett dei spirer om hausten.

Frø av kornblom, klinke og kornvalmue, som alle er vintereittårige, er typiske haustspirarar og er difor vanlege ugras i haustkorn i Danmark og Sør-Sverige. Når desse artene spelar så lita rolla hos oss, kjem det dels av at vi dyrker svært lite haustkorn, og dels av at desse artene ser ut til å ha nordgrensa si i det sørlege Noreg. Dei klarer ikkje vinteren langt nord eller høgt over havet. Det er få ugrasarter som spirer godt midt på sommaren. Det er tilfelle for varmekrevande arter som Solanum nigrum og Galinsoga parviflora, og for arter som har ein kort livssyklus og kan lage fleire frøgenerasjonar på ein sommar, slik som t.d. hos Senecio vulgaris. Frøet hos denne ugrasarta ser elles ut til å vere lite dormant. Det spirer snøgt straks etter modninga. Dette er forresten tilfelle med frø av fleire korgplanter, særleg dei som har fnokk og blir spreidde med vinden. Nymodna frø av hestehov kan til dømes spire med 100% i løpet av eitt døgn etter forsøk av prof. Korsmo. Men hestehoven stikk som kjent fram svært tidleg om våren, og det frøet som er spreidd og spirer på åkeren før vårarbeidingsa tek til, vil som regel gå til grunne under denne. Hestehovfrøet har ingen dormans og misser spireevna etter få månader. Åkertistel har 3-6 månaders dormans og spirer helst om våren (Bakker).

Stort sett er det altså ein sterk periodisitet i spiringa hos dei fleste ugrasarter. Somme spirer helst om våren, andre helst om hausten sjølv om temperatur og råmetilhöva kan vere dei same i både tilfella. Denne periodisiteten i spiringa tyder på at frøet på grunn av arvelege skilnader må få ulike ytre impulsar i stuttare eller lengre tid før spiringa. Det er sannsynleg at det er temperatursvingingane mellom årstidene og daglengda som her gjer hovedutslaget.

Spredjupna for ugrasfrøet

Den optimale spredjupna for ugrasfrøet er jamt over svært lita og ligg for dei aller fleste ugrasarter mellom 0 og 1 cm, og mange av våre vanlegaste åkerugras spirer ikkje når frøet vert nedmolda djupare enn 2-3 cm. Enkelte storkorna frø som hos hønsegurasarter, åkerreddik, åkervortemjølk og kveke kan spire frå djupner ned til 6-7 cm, og floghayre heilt ned til 20-25 cm. Men det er ikkje berre frøstorleiken det går etter. Mellom anna spelar det inn om frøet gror best i lys eller mørke. Kolk har arbeidd med dette spørsmålet, og han har påvist at balderbrå og gul

gåseblom til dømes spirer best i fullt dagslys og därlegast i mørke. Nymodna balderbråfrø spirer best når det ligg helt oppå jorda og ikkje frå større djup enn $\frac{1}{2}$ cm. Men etter som frøet blir eldre, speler lyset mindre rolle for spiringen. I løvetannartene spirer frøet jamt over best ved ein lysintensitet på ca. 8% av fullt dagslys, d.v.s. lystilhøve om lag som ein finn det i engbotnen. Det var elles stor skilnad på dei ulike løvetannartene.

Levetida for ugrasfrøet

Ugrasfrø som ligg under det maksimale spiredjupet, blir dormante og kan liggja i jorda i årtier utan å misse spireevna (sjølv om det er slutt på den primære dormansen), og spire så snart det kjem opp i høveleg spiredjup og årstid som høver for arta. Det er utført mange forsøk over kor lang tid ugrasfrøet kan halda seg i live ved nevgraving i jord. Amerikanaren Duvel (Beltsville 1907) sådde frø av 107 arter av ugras og kulturplanter i blomsterpotter, dekte dei med lokk og grov dei ned til ulike djup: 8, 22 og 42 tommar. Det viste seg da at frøet av dei fleste kulturplantene miste spireevna etter 1 eller 2 år, medan det var liv i heile 51 ugrasarter etter 20 år og 37 arter etter 39 år. Spireevna varte jamt over lengst ved den djupaste nedgravninga.

I eit anna amerikansk forsøk (Beal, Michigan 1879), blei ugrasfrø blanda med sand, fylt på flasker og nedgravne til 18 tommar. Etter 40 år spirte m.a. meldestokk med 4%, groblad med 10%, krushøy mole med 18%. Sistnemnde spirte elles med 52% etter 50 år, 4% etter 60 år, 8% etter 70 år og 2% etter 80 år. Verbascum blataria spirte med heile 70% etter 80 års lagring i jord.

Brenchley i Rothamsted undersøkte innhaldet av spiredyktige ugrasfrø i jorda på eit felt som hadde lege til eng i 58 år. I jordprøver som var tekne så djupt at det var utenkjeleg at frøet kunne ha blitt tilført i engåra, spirte mellom anna Atriplex patula, Polygonum aviculare og Veronica percica. Dei har i England eit ordtak: "One years seeding gives seven years weeding", og det er sikkert ikkje for stridt sagt. Ein kunne heller vera freista til å seia at forsøkt ugrasreinhald er ei arvesynd som kan straffa seg både i 3. og 4. ledd. Ved arkeologiske utgravinger i Danmark og Skåne fann Ødum at frøet hos mange ugrasarter kunne halda seg spirefört i minst 100-600 år. Chenopodium album og Spergula arvensis i minst 1700 år!

Korsmo undersøkte innhaldet av spiredyktige ugrasfrø i norsk kulturjord ved innsamling av over 630 jordprøver fra alle kantar av landet, dels fra åker, dels fra eng. Han la jordprøvene i 2 cm sjikt over ugrasfri mjøle, og talde dei ugrasplantene som spirte opp i løpet av ein sommar. Han kom til at i middel for alle prøver kom det 4.200 spirer pr. m² til 25 cm i åkerjord og 4.300 i engjord. Eitt- og toårige ugras utgjorde 82% i åkerjord og 73% i engjord. Av fleirårige stadbundne ugras var det etter tur berre 6 og 9%. Resten var vandrande ugras. Desse tala tyder på at det er særleg i åkeråra jorda blir tilført ugrasfrø, og at det berre er ein liten brøkdel av desse som går til grunne i engåra. Det var og dei same ugrasartene som dominerte både i åkerjord og engjord, nemlig meldestokk, linbendel, vassarve og småsyre. Høgt på lista kom elles åkergråurt, kvassdå, hønsegrasartene, groblad, løvetann, kveke og krypsoleie.

Kulturjorda vil som regel kvart år bli tilført meir eller mindre ugrasfrø, kanskje først og fremst ved dryssing på vekseplassen, fordi storparten av ugraset vil setje moge frø før grøda blir hausta, i allfall i åkervokstrar og grønsaker. Dessutan kan ein få tilførsle med vinden, t.d. løvetann fra vegkantar, grøftekantar og åkerreiner, og med ureine såvarer og ikkje minst med husdyrgjødsel. Korsmo kom til at ein med full husdyrgjødsling, ca. 6 tonn pr. dekar, ville tilføre over 50 spiredyktige ugrasfrø pr. m². Mye ugrasfrø vil bli tilført husdyrgjødsla med strø og oppsop frå krybber, men dessutan er det mange både norske og utanlandske forsök som syner at mye ugrasfrø kan gå gjennom dyremagen utan å misse spireevna. For balderbrå over fjerdeparten, for hønsegras, meldestokk, småsyre, høyngle og groblad ofte over halvparten.

Dei nyaste undersøkingane på dette området her i landet er gjort av sivilagronom Ryan i samband med si hovedoppgåve ved NLH. Han undersøkte verknaden av halmluting og oppforing på frø av i alt 28 ugrasarter. Han kom til at av 26 arter var det 14 arter som overlevde både luting i 24 timer med 1½% natronlut og deretter oppforing på ku. Mellom dei 14 artene som tolde denne kuren, finn vi dei aller fleste av våre vanlegaste åkerugras. Ja, spirepresenten auka jamvel hos ugras som tungras, vindelslirekne og småsyre, medan åkertistel, åkerdylle og åkerfull spirte snøggare etter luting og oppforing enn ubehandla frø.

Dei fleste ugrasarter produserer ikkje berre kolossale mengder frø, men frøet er utrøleg seigliva og lunefullt når det gjeld spiring. Dei ugrasartene som ved sida av rikeleg frøproduksjon, dessutan har evne til å formeire og spreie seg vegetativt, er sjølvsagt særleg brysame og vanskelege å kome til livs.

Vegetativ formeiring hos ugras

Hos mange av dei såkalla rotugrasa er det den vegetative formeiringa som er hovedårsaka til at dei er så leie ugras.

Krypsoleie til dømes, har krypande stenglar som slår røter frå leddknutar der det samstundes utviklast bladrosettar og blomsterberande skot.

Kveke har krypande jordstenglar, og er kanskje den av våre rotugrasarter som har den sterkeste vegetative formeiringsevna. I 3. års eng fann Korsmo eit tilfelle av 2,9 tonn jordstenglar pr. dekar med ei samla lengd på 495 km, det vil seie som frå Oslo til Bergen. Bylterud har funne over 3 tonn jordstenglar hos kveke i eng, og i eit sylinderforsøk utført ved Institutt for jordkultur, var tørrvekta av dei underjordiske organa hos kveke som hadde fått rå grunnen åleine i 2 år, 4,3 tonn pr. dekar. Den samla lengda av jordstenglane tilsvara over 100 mil pr. dekar. Kvekejordstenglane er seige og ligg i matjordlaget som regel ned til 15 cm djup. Dei er ledd-delte, og ved kvar leddknote sit det adventivknoppar som kan spire opp og laga nye planter når dei blir oppdelte ved jordarbeiding. Av andre ugras med jordstenglar kan nemnast hestehov, skvallerkål, stornesle, kyttbladtistel, ryllik-artene og snelle-artene.

Åkerdylle har krypande formeiringsrøter (ekte rotutløparar) som ligg svært grunt, 2-10 cm, og blir difor sterkt oppdelte av plog, harv og særleg jordfresar. Desse røtene er tett sette med adventivknoppar, slik at stubbar ned til $\frac{1}{2}$ cm kan laga nye planter. Åkertistel har derimot horisontalt krypande formeiringsrøter i fleire etasjar som for det meste ligg under plogmålet, slik at ein ikkje når i dei med jordarbeidingsreiskapen. Geiterams, småsyre og vegkarse har og ekte rotutløparar.

Åkersvinerot og åkermynte derimot formeirar seg vegetativt ved hjelp av stengelknollar på analog vis som hos potetplanta. Det finst elles vegetativ formeiring på ymse andre måtar, t.d. ved både jordlauk og topplauk som hos somme ville laukarter.

Dr. Bunting i Oxford har peika på det forhold at dei fleste fleirårige ugras er polyploide, og meiner at det er ein samanheng mellom dette og den sterke vegetative formeiringsevna hos t.d. kveke og skvallerkål. Men av våre vanlege fleirårige ugrasarter skal i allfall åkertistelen alltid vera diploid.

Hos dei fleste stadbundne ugrasartene vantar aktiv, vegetativ formeiring og spreiling, men hos mange av dei, mellom anna alle med pålerot og ein del med rotstokk, har evna til vegetativ regenerasjon frå rotdelar ved oppdeling t.d. ved jordarbeiding. Og alle som har prøvd oppstikking av løvetann i plen, veit at det snart kjem att nye bladrosettar dersom ein ikkje får opp heile rota. Skota kjem her frå sjølve sårfleta.

På bakgrunn av det vi no veit om formeirings- og spreilingsevna til ugraset, og den effektive biologiske tilpassing det har til å overleve i sin kamp for tilværet, er det ikkje noko rart at plantedyrkaren må føra ein endelaus krig mot ugraset.

Gjennom tusentals år har denne krigen vore ført med fysiske våpen. Det er neppe tvil om at det eldste av alle ugrasmiddel er flittige kvinnehender. Ugrastyninga er elles etter kvart blitt meir og meir mekanisert, og i dag har vi dessutan eit heilt arsenal av kjemiske våpen, som har revolusjonert ugrasstriden fullstendig.

Spreiling av ugrasfrø

Ugrasfrø kan bli spreidd på mange måtar og vegar:

Spreiling med vind. Ugrasfrø som er forsynt med fnokk, slik som hos dei fleste korgplanter, eller med lange hår som hos geiterams, kan fare lange vegar med vinden. Sporene hos nose, sneller og bregner blir og spreide med vinden.

Spreiling med vatn. Frø som fell i rennande vatn kan bli spreidd lange vegar på denne måten. Dette er t.d. ein vanleg spreulingsmåte for selsnepe, soleiehov og andre ugras som veks på særleg våte stader. Flughavar kan også spreie seg på denne måten, dersom ein kaster oppluka planter eller flughavrefengt avfall i elva eller bekken.

Spreiling med dyr og menneske. Somme ugrasarter har frø med piggar eller krokar som hekter seg fast i pelsen på dyr eller i kleda på folk og spreier seg på den måten. Andre frøslag, som t.d. raudknapp, blir spreidde

av maur. Fuglane set til livs store mengder av visse slag ugrasfrø som delvis kjem att med spireevna uskadd.

Spreiing på vekseplassen. Storparten av ugraset vil setje moge frø før grøda blir hausta. Det som ikkje blir spreidd på dei ovafor nemnde måtane, vil i poteter, rotvokstrar og grønsaker o.l. falle på jorda på vekseplassen og bli blanda inn i jorda ved jordarbeidingsreiskapen. I kornåker og eng vil ein heil del ugrasfrø drysse på jorda før, og særleg under hausting og berging. Resten vil bli med grøda i hus, for neste vår ofte å bli spreidd ut att med därleg reinsa såvarer og især med husdyrgjödsel og kompost.

Skurtresking kan spreie meir ugrasfrø på åkeren enn dei gamle hauste- og bergingsmåtane. For det første vil mange ugrasarter, som t.d. flog-havre og då-arter, få tid til å kaste det meste av frøet på bakken før skuren. Dessutan vil mye ugrasfrø bli blåse utover åkeren saman med agnene og halmen. I medeltal for 32 tyske forsök med skurtreskarar (K. Petzoldt) fann ein denne fordelinga av det ugrasfrøet som gjekk gjennom skurtreskaren:

I korn og avrens	65%
I agnene	20%
I halmen	10%
I halmstubben	5%

Det er særleg små og lette frø, eller frø med gode flygeeigenskapar, som følgjer med agnene. Men det har og mye å seie kor sterk vind vifta gir.

Spreiing med såvarer. Med ureint engfrø blir det ofte spreidd mye ugras. I frøenga vil alle ugras nå full modning. Engfrøet er vanskelegare å reinse enn såkornet fordi mange ugrasfrø har liknande storleik, form og vekt som kulturfroet. Sjølv med berre 0,5% ugrasfrø i engfrøet, kan ein med ei såmengd på 3 kg pr. dekar så 30-40 ugrasfrø pr. m^2 . Det går t.d. 3 frø av småsyre eller balderbrå på 1 mg.

I såkornet er det åkerreddik og floghavre som er vanskelegast å reinse frå. Etter norsk lov er det forbode å omsetje såvarer som inneholdt flog-havre.

Spreiing med husdyrgjødsel. Korsmo undersøkte innhaldet av spireført ugrasfrø i husdyrgjødsel frå alle kantar av landet. I medeltal for 615 prøver av alle slag husdyrgjødsel, både fersk og gjæra, kom han til at vi med ei vanleg gjødsling på 6 tonn pr. dekar tilfører jorda 53 spireføre ugrasfrø pr. m^2 . Dei dominerande ugrasartene var meldestokk, tunrapp, vassarve, hönsegras, linbendel, tungras, småsyre og lövetann, med rangordning som her nemnt.

Skilnaden mellom fersk og gjæra husdyrgjødsel var mindre enn ein skulle ha venta. For storfegjødsel var det etter tur 53 og 44 ugrasfrø pr. m^2 for full husdyrgjødsling. Danske forsök har vist at ugrasfrø som ligg på overflata i gjødselhaugen ikkje misser stort av spireevna under gjæringa, medan dei som ligg i djupare lag blir øydelagde.

Mange norske og utanlandske forsök syner at mye ugrasfrø kan gå gjennom dyremagen utan å misse spireevna. For balderbrå over fjerdeparten og for hönsegras, meldestokk, småsyre, höymole og groblad ofte over halvparten. Ei svensk undersöking viste elles at det berre er ikkring fjerdeparten av ugrasfrøet i husdyrgjødsela som har gått gjennom dyra. Resten blir tilført direkte med halmstrøy, oppsop og liknande.

Agner, avrens og höymo inneheld alltid store mengder ugrasfrø, og må ikkje nyttast til strøy og heller ikkje til før, dersom ikkje spireevna hos ugrasfrøet er øydelagt, t.d. ved kokking.

Skaden ugraset gjer

Ugraset gjer skade på mange måtar. Det konkurrerer med kulturplantene om plass, lys, vatn og næring. Ugraset har mange føresetnader for å vinne i denne konkurransen. Det spirer før og veks snøggare enn kulturplantene ved låg temperatur, og under elles ulaglege veksevilkår. Ugraset vil difor lett få eit forsprang frå våren av, gro over og konkurrere ut kulturvokstrane, dersom vi ikkje kjem dei til hjelp på ein eller annan måte.

Jorda inneheld som regel meir enn nok ugrasfrø og vegetative formeiringsorgan av rotugras til at alle berre flekker straks vil gro over med ugras. Mange ugras er breidblaða og högvaksne og er difor harde konkurrentar både om plass, sol og lys. Enda viktigare er det kanskje at mange ugrasarter har eit sers kraftig rotsystem, og vinn i konkurransen om vatn

og næring. Det som ugraset tek, kan ikkje kome kulturplantene til gode. På jord som t.d. har mye rotugras, kan ugraset innehalde like mye N, P og K som det trengst til ei middelavling av jordbruksvokstrane. Det er og lett å sjå at ugrasfull åker toler tørken dårlegare enn ugrasrein.

Kvaliteten av avlingane kan bli skadd både direkte og indirekte. Høy og beitegras som inneheld grove og usmakelege ugras som balderbrå, hundekjeks, sølvbunke, engsoleie, höymole, eller tistel m.fl. har sjølvsagt sterkt redusert fôrverdi. Ville laukarter og pengeurt kan setje usmak på mjølk, smør og kjøt.

Mange åker- og hagevokstrar kan få dårlegare kvalitet, eller bli heilt useljelege, berre på grunn av at konkurransen med ugraset har hindra full utvikling. Ugrasfull lo er vanskeleg å få skikkeleg tørr, og det kan bli uråd å nytte skurtreskar i ugrasfull åker.

Giftplanter. Mange ugras er svært giftige for folk og fe. Dette gjeld t.d. selsnepe, landbøya, dikesvineblom, myrsnelle, villrot, giftkjeks, hundepersille, klinte, svimling og vortemjølk m.fl.

Vertplanter for parasittar. Dei aller fleste parasittære plantesjukdomar og skadedyr som herjar på dyrka planter, kan leve vidare og formeire seg på nærskyldne ugrasarter. Kveke t.d. kan ha både fotsjukdomar, mjøldogg, svartrust, mjølauke og grasmidd. Krossblomstra ugras kan vere vertplanter for klumprot, jordlopper, kålsommarfugl, kålmöll og kålfuge. Skjermblomstra ugras hyser skjermplanteskimmel og gulrotfluge m.fl. Meldeartene hyser betefluge, og svartsötvier er vertplante for potetkreft og potetål. Åkersvinerot er og vertplante for potetål.

Arbeid og utgifter. Ugraset fører med seg mye ekstra arbeid og utgifter til maskinar og reiskap, både ved sjølve plantedyrkinga og ved korn- og frøreinsing, frøkontroll, vedlikehald av opne grøfter og kánalar, vegar, tun, prydhagar med meir.

Etter norsk lov er det forbode å selje eller avhende såvarer som inneheld over ein viss prosent ugrasfrø i alt, eller over eit visst frøtal pr. kg av "vondarta ugras". Det er vidare forbode å selje heilt korn til fôr. Vidare er det gitt andre forbod og påbod med sikte på å hindre spreiling av floghavre.

Skjemmer vekselassen. Dei fleste ugras er ikkje prydplanter. I kulturjorda er elles ugraset til lite glede for eigaren om det blomstrar aldri så vakpert. Og faktisk har ein ugrasfull eigedom sterkt redusert salsverde.

B I O L O G I S K E U G R A S G R U P P E R

I ugraslæra deler vi ugraset i grupper etter dei eigenskapane som har størst praktisk interesse i ugrasstriden, utan omsyn til den vanlege botaniske systematikken. Av særleg interesse i denne samanhengen er levetida og formeiringsmåten hos ugraset. Inndeling etter slike eigenskapar kaller vi biologisk inndeling.

Sommareittårige ugras

Sommareittårige (sommaranuelle) ugras lever berre ein sommar. Dei spirer opp av frø om våren, blomstrar og set frø, og deretter dør heile planta, både rota og alt. Dei overvintrar altså berre som frø.

Frøproduksjonen er som regel svært rikeleg, og frøet modnar samstundes eller før den grøda ugraset veks saman med. Det frøet som fell på jorda spirer vanleg først neste vår, men dersom det blir djupt nedgrave ved jordarbeidninga, kan det ligge i jorda i mange år utan å misse spireevna. Planter som spirer først til å nå full utvikling før vinteren, går som regel til grunne utan frøsetjing, men det hender i milde vintrar at visse arter klarer å overvintre.

Sommareittårige ugras kan berre utvikle seg i større mengd der jorda blir arbeidd om våren. Dei fleste av våre vanlegaste såkalla "frøugras" i åker og hage hører til denne gruppa. Dei viktigaste artene er: Flohhavre, meldestokk, kvassdå, guldå, linbendel, hønsegreasartene, tungras, vindelslirekne, åkerfull, åkersenne, åkerkål, åkerreddik, klengjemaure, åkerstemorsblom, tunbalderbrå, åkervortemjølk og jordrøyk.

Vintereittårige ugras

Vintereittårige (winteranuelle) ugras har normalt evne til å overvintre. Spirer frøet tidleg nok i vekseperioden, blomstrar plantene og set modent frø før vinteren, på same måten som dei sommareittårige, men ein del av frøet spirer vanleg om hausten, og plantene overvintrar, blomstrar og set frø neste vår og sommar. Vårmadna frø på overvintra planter kan spire og plantene nå frømodning same året, slik at det blir 2 frøgenerasjonar på eitt år. Vi har berre 10 vintereittårige ugras som er særleg viktige: Vassarve, giætaritaske, raudtvitann, pengeurt, åkersvineblom, haremat, tunrapp, stemorsblom, åkerminneblom og sandskrinneblom.

Toårige ugras

Særmerkt for dei to-årige (bianuelle) ugrasartene er at dei normalt ikkje blomstrar og lagar frø før året etter spiring. Anten dei spirer tidleg om våren eller seinare på sommaren, utviklar dei første året berre røter og ein bladrosett som overvintrar. Etter frømodninga i 2. året dør heile planta. Dei viktigaste artene er: Balderbrå, rugfaks, lodnefaks, myrtistel, vegtistel, krusetistel og dikesvineblom.

Fleirårige stadbundne ugras

Til denne gruppa reknar vi alle ugrasarter som normalt lever i meir enn to år, og som ikkje kan formeire og spreie seg vegetativt ved eiga hjelp. Sjølv plantene er såleis stadbundne (stasjonære), men dei kan sjølvsagt spreie seg ved hjelp av frø på ymse vis. Rota hos somme arter har likevel vegetativ regenerasjonsevne når den blir oppdelt eller sterkt skadd. Men det må altså ein ytre impuls til for at denne formeiringsmåten skal fungere.

I spirlingsåret utviklar dei fleste fleirårige stadbunde ugras berre rot og bladrosett. I andre året held utviklinga fram, og som regel blomstrar plantene og set frø for første gong. Nokre arter blomstrar alt i spirlingsåret (t.d. følblom og smalkjempe). Etter frømodning visnar dei ovanjordiske plantedelane ned kvar haust, men rota lever vidare og set nye blad og blomsterberande skot kvar vår gjennom fleire år. Lysskota kjem dels frå hovudrota og dels frå den underjordiske delen av stengelen.

Det er særleg i eng og beite, og andre stader der planta kan vekse i fred i lengre tid, at ein finn ugras som høyrer til denne gruppa. Dei blir ofte kalla for "engugras".

Denne ugrasgruppa kan elles delast i 4 undergrupper etter rottypen.

Dei viktigaste ugrasartene er:

Med trevlerot: Engsoleie, følblom, blåkoll og sølvbunke.

Med rotstokk: Prestekrage, gul gåseblom, landøyde, engkarže, smalkjempe, groblad, burøt og selsnøpe.

Med pålerot: Dunkjempe, vinterkarse, russekål, høy mole, krushøy mole, byhøy mole og løvetann.

Med uekte rot: Engmose.

Fleirårige vandrande ugras (Rotugras)

Aile arter i denne gruppa har kontinuerleg vegetativ formeiring og spreiling. Dei formeirer seg dessutan med frø eller sporer. Når dei veks opp av frø, lagar dei første vekseperioden berre bladrosett og rot som overvintrar. Dei fleste artene blomstrar og set frø første gongen året etter, altså i 2. leveåret, men somme først 3. året (hestehov, hundekjeks og skvallerkål). Mange arter er svært frørike. Dessutan formeirer dei seg som nemnt stendig vegetativt på ymse vis, utan ytre inngrep. Dei har også vegetativ spreingsevne, og er såleis ikkje stadbundne, men "rotvandrante". Mange av dei mest brysame ugrasartene, både i åker og grasmark, er rotugras.

Etter den vegetative formeiringsmåten kan rotugraset delast i fleire undergrupper:

Med krypande, rotstående stenglar (tæger): Krypsoleie og gåsemure.

Med krypande jordstenglar: Kveke, skvallerkål, ryllik, nyseryllik, hestehov, stornesle, stormaure, åkersnelle og einstape m.fl.

Med krypande formeiringsrøter: Åkertistel, åkerdylle, geiterams, småsyre, vegkarse og åkervindel.

Med stengelknollar i jorda: Åkersvinerot, åkermynte og vårkål.

Med vegetativ formeiring på ymse andre måtar: Matsyre, ugrasklokke, hundekjeks, mjödurt, tyrihjelm, lyssev og knappsev m.fl.

U G R A S A R T E R

Dei vanlegaste ugrasartene i Noreg skal omtalaast meir utförleg og er ordna etter biologisk gruppe. Innanfor kvar gruppe er artene ordna alfabetisk etter latinsk namn, slik at ugras som hörer til same slekta kjem etter einannan. Mindre viktige ugras blir berre nemnde med namn i slutten av kvart gruppeavsnitt. Norske og latinske namn er etter Johannes Lid: Norsk og svensk FLORA. Autornamn er sløyfa.

I. SOMMAREITTÅRIGE UGRAS

K R O K H A L S (*Anchusa arvensis*) Rubladfamilien

Sommareittårig ugras som formeirer og spreier seg berre med frø.

Krokhals har tungeforma ruhåra blad, dei øvre breiast ovafor midten. Blomsteren er først raudleg, sidan lysblå. Kronrøyret er litt krøkt nedanfor midten, derav namnet krokhals.

Krokhals er ugras i åker på Austlandet og rundt kysten til Haugesund. Finst og i nokre fjordbygder vestafjells og nordafjells til Troms. Trivst best på kalkfattig, lettare jord. Frøet drys lett på åkeren.

Motarbeiding og tyning

Kalking, sterkt gjødsling og reine såvarer er dei viktigaste førebyggande rådgjerdene.

Poteter og rotvokstrar må haldast grundig reine, slik at frøkasting blir hindra.

Vi har ingen norske forsök med kjemiske middel mot krokhals. Etter utanlandske oppgåver har fenoksyeddiksyrer ingen verknad.

S V I N E M E L D E (*Atriplex patula*) Meldefamilien

Sommareittårig ugras som formeirer og spreier seg berre med frø.

Svinemelde er vanleg berre i dei sørlege, lågare delane av landet vårt. Den finst opptil 170 m over havet, og langs kysten til Sør-Varanger.

Planta liker kalkrik, godt gjødsla og veksekraftig jord, og er difor mest brysam som hageugras. Den veks særleg frodig på komposthaugar og og avfallsplassar, ved gjødseldynger og på stader der det er tilsig av flyttande gjødsel. Svinemelde har spydforma blad med kileforma grunn og er utan mjøl. Blomsteren har rombeforma forblad med to sidetaggar.

Motarbeidning og tyning

Ein nyttar dei same førebyggande rådgjerdene som nemnt for meldestokk. Grundig reinhald av radreinska vokstrar er viktig.

Vi har ingen norske forsök, men etter Weed Control Handbook skal svine-melde kunna tynast med dei same herbicida som meldestokk.

F L O G H A V R E (*Avena fatua*) Grasfamilien

Floghavre blir og kalla villhavre, landhavre og trollhavre. Somme stader kallar ein dette ugraset svarthavre. Men dette namnet kan føre til mistyding, da det finst dyrka havresortar med svarte korn.

Floghavre liknar vanleg havre, som den står så nær at dei kryssar innbyrdes. Vi har likevel fleire kjenneteikn på floghavre. Stråa er oftest lengre enn hos vanleg havre. Rislene er store og glisne med lange sprikjande og slappe sidegreiner. Vanleg havre har som regel tettare risle med meir oppretta sidegreiner. Floghavre har som regel 2-3 korn i kvart småaks, og alle korn har eit langt knebøygd snerp som er spiral-snodd og svart nedanfor kneeet. Dette at alle korn har snerp, er eit av dei sikre kjennemerka. Somme dyrka havresortar har og snerp, men det er i tilfelle berre eitt korn i kvart småaks som har snerp, nemleg ytterkornet, d.v.s. det største kornet.

Det andre og sikraste kjennemerket på floghavre er at kornet sit på eit skålforma frøfeste, som gjer at korna fell ut etter kvart som dei modnar fordi det blir laga eit løysingslag i den ringen som fester kornet til toppgreina. Korna modnar og drys først frå toppen av risla. Hos vanleg havre sit kornet fast på ein tapp og drys ikkje så lett ved modning.

Kring frøfestet og på bukstilken hos floghavre sit det elles alltid ein tett krans med korte eller lange hår, som saman med snerpet tener til å spreie frøet. Det klorer seg fast til sekker, klede, maskinar o.l. Ved skiftande råmetilhøve kan frøet krype bortover eller bore seg ned i jorda ved at snerpet rettar seg ut når det blir vått og krökjer seg att når det tørkar. Kornfargen er mest aldri rein kvit eller gul, men skiftande frå gråvit til tjørebrun eller svart. Det er fleire varietetar av floghavre som kan skiljast etter farge og hårklednad.

Floghavren formeirer og spreier seg berre med frø. Ei plante kan ha opptil 500 frø. Den buskar seg sterkt, og da sideskota utviklar seg til ulik tid, har floghavren både modne og umodne frø ved alle haustetider. Noko vil alltid drysse på jorda før og under hausting, og noko vil bli med i korn, halm og avrens. Frøet er svært spiretregt, og det er berre få frø som spirer same hausten. Frø som blir pløygd ned kan ligge i jorda i årevis utan å ta skade.

Spreiingsvegane er dei vanlege for frøugras: Med urein såvare, ved drysing på åkeren, gjennom husdyrgjødsel etter bruk av ureine strøymiddel, eller føring med melde, lettkorn og førkorn som inneheld floghavre og som ikkje er kokt eller finmale. Den kan og spreie seg med halm, treskeverk, skurtreskarar og andre maskinar og reiskapar og med brukte sekker.

Motarbeiding og tyning

Dei viktigaste førebyggjande rådgjerdene er å hindra at floghavren kjem inn på garden: Set strenge krav til såkornet. Kjøp helst statskontrollert såvare. Kjøp ikkje brukte, ureine kornsekker. Syt for skikkeleg reingjering av skurtreskjær, halmpresse og sjølvbindar som blir flytta frå gard til gard. Bruk ikkje halm til før utan at den er skikkeleg luta.

Omlegging av drifta til meir einsidig korndyrking etter krigen førte til sterk spreiling av floghavre i flatbygdene på Austlandet, og spreilinga held fram trass i at vi sidan 1958 har hatt forskrifter for å førebygga spreiling av floghavre med mellom anna forbud mot floghavre i såvarer. Dei lovreglane som gjeld i dag finn ein i "Forskrifter for å førebygge spredning av floghavre, fastsatt ved Kgl. res. av 29. juni 1962 i medhold av midlertidig lov om floghavre av 6. april 1962 og lov om såvarer av 17. juli 1953", med seinare endringar og tilføyinger.

Eigar eller brukar av fast eide dom som har kjennskap til eller mistanke om at det finst floghavre på eigedommen, har plikt til straks å melda frå til jordstyret, som igjen melder frå til landbruksseksjonen og Statens plantevern. Planteprøve skal følgja med meldinga. Statens plantevern har fullmakt til å avgjera om det er floghavre eller ikkje. Plantevernet og rettleiingstenesta i fylket skal gi rettleiing om rådgjelder og tiltak for å bli kvitt dette ugraset.

Dersom arbeidet er overkomeleg, er luking ei av dei viktigaste rådgjerdene. Absolutt alle floghavreplanter må ein luke vekk straks. Sjølv nokre få planter kan bli svært dyre og vil skaffe mye arbeid i årevis om dei får stå i fred og kaste frø.

I kveite og byggåker ser vi lett dei opne rislene som rekk opp over åkeren når vi bøyer oss ned og siktar langs toppane. Luk opp heile planta og pass på å få med sidestråa. Har den modne frø, må ein stappe planta direkte i ein papirsekk. Gå systematisk langs såradene og brenn alt som blir luka opp. Når vi veit at det finst floghavre i åkeren, kan lukearbeidet gjerast lettare ved å tette att ein sålabb eller endre markören slik at vi får smale gangar å gå i. Luk minst 3 gonger med vel ei vekes mellomrom.

Dyrk ikkje havre på skifte der du veit at det er floghavre i jorda. Brenn all halm der det er mye av dette farlege ugraset.

Er det mye floghavre, kan lukearbeidet reduserast monaleg ved å sprøyte med tri-allat ved såing av bygg eller oljevokstrar. Dette midlet tyner 80-90% av floghavreplantene, men det er svært viktig å luke bort alle overlevande planter.

Dersom det er særleg mye floghavre, nyttar det ikkje å handluke. Det beste er da å leggja att til eng, for der kjem ikkje floghavren opp, eller dyrke vokstrar som blir hausta tidleg, t.d. fôrraps og raigras. Kulturar som kålrot og poteter er også bra, men hugs på å luke floghavreplantene som står att etter radreinsinga.

Forsök utført av Haldor Fykse har vist at storparten av floghavrefrøa i jorda går til grunne etter 4-5 år under eng. Vekselbruk er såleis i dag som før det beste midlet mot floghavre på lang sikt.

ÅKERKÅL (*Brassica campestris*) Krossblomsterfamilien

ÅKERREDDIK (*Raphanus raphanistrum*) Krossblomsterfamilien

ÅKERSENNEP (*Sinapis arvensis*) Krossblomsterfamilien

Desse 3 ugrasartene skal omtalast under eitt, trass i at dei hører til ulike slekter.

Desse gule korsblomstrane er så like å sjå til at praktikarane har vanskeleg for å skilje dei. Men åkerkålen kan skiljast frå dei andre to ved at blada går kring stengelen og er glatte og blådogga som kålrotblad,

medan blada hos åkersennep og åkerreddik ikkje går kring stengelen og er lysegrøne som nepeblad. Desse to artene skil ein på at begerblada er utståande hos åkersennep og tiltrykte hos åkerreddik. Den sistnemnde planta er elles lett å kjenne på dei perlesnorforma leddskulpene. Desse brotnar lett av ved ledda under treskinga, og "knoppane", som har liknande storleik som korn, er ofte vanskelege å reinse frå. Åkerreddik blir rekna som "vondarta ugras" etter såvarelova.

Frø av desse ugrasartene kan ligge i jorda i årtier utan å misse spirelevna, men det gror snøgt når det kjem opp i sjiktet 0;5 cm frå overflata. Nymodna frø har lita spirelevne.

Desse ugrasartene er vanlege åkerugras mange stader i landet vårt: Åkerreddik til Nord-Trøndelag, åkersennep og åkerkål til Troms. Mest skaude gjer dei i vårkorn. Åkerreddik er surjordplante medan åkersennep liker best kalkrik jord. Åkerkål trivst best i noko rå til vassjuk jord.

Motarbeiding og tyning

Alle desse ugrasartene formeirer og spreier seg berre med frø. Det er difor svært viktig å hindre frökasting mest mogleg. Melde og anna avrens og avfall bør ein brenne eller grave ned. Bruk såkorn som er fri for åkerreddikfrø. Bygg er vanskeleg å reinse for leddstykken av skulpene. Kalking av sur jord motarbeider åkerreddik. God jordarbeiding, allsidig gjødsling, såing i rett tid og alt anna som fremjar ei jamm og snøgg spiring og kraftig vekst hos kulturplantene gir ugraset mindre makt i konkurransen om vekseplassen.

Ugrasharving ein eller to gonger før spiring i korn- og potetåker og særleg radreinsking i alle slag radkulturar er effektive tyningsmåtar.

MCPA og andre fenoksysyrer er særleg effektive mot alle eittårige krossblomstra ugras. Dinoseb og amitrol verkar og svært godt. Etter Weed Control Handbook kan dei elles tynast med prometryn, linuron, lenacil og pyrazon, men er motstandsføre mot nitrofen, propaklor og trifluralin som er selektive i visse krossblomstra kulturar.

F L I K B R Ö N S L E (*Bidens tripartita*) Korgplantefamilien

Sommareittårig ugras som formeirer og spreier seg berre med frø. Flikbrönsle er vanleg i låglandet, særleg på Austlandet. Veks på våte stader, i opne grøfter, ved dammar, vasspyttar o.l., men og i vassjuke åkrar.

Motarbeidning

Grøfting er det viktigaste motmiddel. Kan elles tynast med MCPA + dinoseb.

M E L D E S T O K K (*Chenopodium album*) Meldefamilien

Sommareittårig ugras som formeirer og spreier seg berre med frø. Meldestokk har mange former som stundom er rekna som arter.

Meldestokk er det vanlegaste og mest brysame eittårlige ugras i åker og hage over heile landet til korngrensa. Meldestokk liker sterkt gjødsla jord, og gjer seg mest gjeldande i rotvokstrar og grønsaker, men er elles vanleg i all open åker. Den finst og i yngre eng og veks frodig på komposthaugar, kring gjødseldyngjer og på liknande stader. Planta produserer store frømengder, opptil 20.000 pr. plante (i medeltal 3.000). Etter gransakingane til Korsmo er meldestokkfrø av dei ugrasfrøa som oftest finst i melde, husdyrgjødsel og kulturjord. Frøet spirer seint når det har vore lagra tørt, men snøgt etter overvintring i jorda. For frø som ligg for fjupt til å spire, kan spireevna vare i fleire tiår.

Motarbeidning og tynning

Da meldestokk formeirer og spreier seg berre med frø, er det viktig å hindre frøspreiing. Frøet drys relativt lite før hausting. Avrens og oppsop bør ein brenne, slik at det ikkje kjem over i gjødsla. Luting av halm aukar spireprosenten hos meldestokkfrøet, medan det blir øydelagt i AIV-silo, t.d. saman med blad av rotvokstrar.

Ugrasharving, radreinsking og kjemikal er dei viktigaste direkte motmidla. Blada er tett sette med kuleforma kjertelhår ("mjøl") slik at svoveltsyresprøyting har liten verknad, men meldestokk er svært lett å tyne med mange av dei herbicida vi har fått etter krigen. I kornåker vil MCPA og andre fenoksysyrer brukt ublanda eller i blanding med dinoseb eller joksynil, tyne 95% eller meir av dette ugraset. MCPA + linuron tyner over 99%. I visse andre grøder vil linuron ta 95% ved sprøyting i rett tid, simazin, prometryn, desmetryn og terbutryn vil ta ca. 90%, det same gjeld dinoseb, propanil og nitrofen. Mineralolje, trifluralin, CIPC, propaklor, fenmedifam og diquat har og brukbar verknad, medan over halvparten av plantene overlever etter sprøyting med pyrazon eller amitrol.

B L Å M E L D E (*Chenopodium glaucum*) Meldefamilien

F R Ö M E L D E (*Chenopodium polyspermum*) Meldefamilien

R A U D M E L D E (*Chenopodium rubrum*) Meldefamilien

Alle desse meldeartene er vanlege ugras berre i dei sørlege og lågare stroka av landet, serleg på Austlandet og Sørlandet. Dei liker sterkt gjødsla veksekraftig jord, og er difor mest brysame som hageugras. Veks dessutan ofte på gjødsel- og komposthaugar og på avfallslassar.

Blåmelde har blad som minner om eikeblad, frømelde har heilranda, eggforma blad som smalnar mot bladskiftet, raudmelde har oftast raudfaraga, trekanta blad med store framrette tenner. I motsetnad til meldestokk har ingen av desse artene "mjøl" på oversida av blada, men blåmeldeblada er mjøla på undersida. Vi har ingen forsök ned tyning av desse ugrasa, men det er god grunn til å prøve dei same midla som for meldestokk.

G U L L K R A G E (*Chrysanthemum segetum*) Korgplantefamilien

Sommareittårig ugras som formeirer og spreier seg berre med frø. Plantta liknar prestekrage, men skil seg frå denne ved å ha gule randkronger, snau saftig stengel og blågrøne grovtagga blad med brei grunn som går mest omkring stengelen.

Gullkrage er ei kalksky plante, og er difor meir sjeldsynt i åkrane no enn før, og finst mest på avfallslassar på Austlandet og langs kysten like til Alta. Gullkrage er resistent mot MCPA og har i dei seinare åra teke seg opp og blitt eit ugrasproblem i somme bygder i Vestfold.

Motarbeidning og tyning

Kalking av sur jord og bruk av reine såvarer er dei viktigaste førebyggjande rådgjerdene.

I kornåker kan gullkrage tynast ved tidleg sprøyting med MCPP + dinoseb eller MCPP + joksynil. Bromfenoxin er elles eit nytt spesialmiddel mot gullkrage som kjem i handelen våren 1972.

Å K E R G U L L (*Erysimum cheiranthoides*) Krossblomsterfamilien

Sommareittårig ugras som formeirer og spreier seg berre med frø. Åker- og hageugras som er vanleg opp til korngrensa austafjells. Finst meir spreidd vestafjells og nordover til Troms. Trivst best på lettare jord.

Åkergull har rak stengel med få smale og heilranda blad med stjernehår. Små gule blomstrar og lange smale firkanta skulper med kort griffel.

Åkergull kan motarbeidast og tynast med dei same middel som åkersennep, men åkergull er sterkare mot mineralolje.

Å K E R V O R T E M J Ö L K (*Euphorbia helioscopia*) Vortemjølkfamilien
Sommareittårig ugras som formeirer og spreier seg berre med frø.

Åkervortemjølk er eit vanleg hage- og åkerugras, særleg austafjells og opp i fjellbygdene, sjeldnare på Vestlandet og nordover til Lofoten.
Planta trivst best på lett jord og i rotvokstrar og grønsaker.

Motarbeiding og tyning

Dei mekaniske tyningsmåtane er dei beste rådgjerdene. Det gjeld å hindre frøsetjing og frökasting. Planta har sterkt vokslagde blad.

Åkervortemjølk er vanskeleg å tyne med kjemiske middel. Etter Weed Control Handbook er dinoseb og linuron dei mest effektive herbicida for selektiv tyning av dette ugraset. (Sjå og side 83).

J O R D R Ö Y K (*Fumaria officinalis*) Valmuefamilien

Sommareittårig ugras som formeirer og spreier seg berre med frø. Frøet toler oppføring og kan ligge i jorda i mange år utan å misse spireevna. Jordrøyk er eit vanleg ugras over heile landet nord til Troms. Trivst best på lettare næringsrik jord, og gjer seg mest gjeldande i grønsaker, rotvokstrar og poteter, men finst òg ofte i kornåker.

Motarbeiding og tyning

Ugrasharving, radreinsking og luking er dei viktigaste mekaniske tyningsmåtane.

Dei viktigaste førebyggande rådgjerdene er å hindre plantene i å setje frø, eller i det minste hindre at frøet kjem over i husdyrgjødsla.

Jordrøyk er vanskeleg å tyna med kjemiske middel. Fenoksypropionsyrer verkar betre enn MCPA. I korn har vi fått dei beste resultata med MCPA + dinoseb og fenoksysyrer + joksynil. Dinoseb åleine, mineralolje, prometryn, desmetryn og terbutryn kan og gi godt resultat i kulturar som toler desse middel. Jordrøyk er svært sterk mot linuron og amitrol. Planta har blågrøne, findelte og sterkt vokslagde blad.

G U L D Å (*Galeopsis speciosa*) Lepeblomsterfamilien

K V A S S D Å (*Galeopsis tetrahit*) Lepeblomsterfamilien

Sommareittårige ugras som formeirer og spreier seg berre med frø.

Desse ugrasartene er svært like å sjå til før dei tek til å blomstre. Dei har firkanta stenglar med tjukke stivhåra leddknutar. Guldå har gul lepeblomster som er fiolett ytst på underlepen. Kvassdå har raud eller kvit blomster.

Dåartene er vanlege ugras i alle slag åker over heile landet. Guldå er verst i kyststrøka. Dei finst på alle slag jord, men trivst best på moldrik mineraljord og myrjord.

Frøet har lett for å drysse like etter modninga. Det blir pressa ut av begeret ved at dette trekkjer seg saman. Frøet er svært fettrikt (39%) og spirer ikkje før det har overvintra i jorda. Melde, dyregjødsel og kulturjord inneholder ofte store mengder frø av desse ugrasartene. Spireevna varer i mannsaldrar for frø som ligg for djupt til å spire.

Motarbeidning og tyning

Dåartene kastar mye av frøet på jorda før grøda blir hausta. Å hindre frökasting ved godt reinhald i åkeren er difor ei viktig førebyggande rådgjerd. Dei er elles relativt lette å tyne med ugrasharving, radreinsking og kjemiske middel.

Frøet blir øydelagt ved halmfluting og i AIV-silo.

Dei mest effektive kjemiske middel i korn er MCPA + dinoseb, MCPA + linuron og MCPA + 2,4-DP + joksynil, som alle tyner ca. 95% av plantene. I visse andre kulturar får ein svært god verknad av dinoseb, linuron, prometryn, terbutryn, lenacil, fennedifam, trifluralin og amitrol. Nitrofen og propaklor verkar og relativt bra mot dåarter, som elles er sterke mot propanil og pyrazon.

K L E N G J E M A U R E (*Galium aparine*) Maurefamilien

Sommareittårig ugras som formeirer og spreier seg berre med frø.

Klengjemaure har stengel og blad med nedvende broddar så planta kan klengje seg til andre planter. Frøet har 1-2 mm lange krokpiggjar som kan hekte seg fast i klede, reiskap og dyr slik at frøet kan spreie seg på den måten.

Klengjemaure er eit vanleg ugras i åkrar og hagar i heile landet nord til Troms, sjeldnare i Finnmark. Trivst best på kalkrik jord.

Motarbeidning og tyning

Klengjemaure er resistent mot MCPA. Einsidig bruk av dette ugrasmidlet har ført til at klengjemauren har teke seg sterkt opp mange stader dei seinare åra.

Å bruke reint såkorn og å hindre dryssing av frø på marka er viktige førebyggande rådgjerder. Då nymodna frø spirer lett, er stubbharving straks etter skuren tilrådeleg.

MCPP og 2,4-DP er svært effektive mot klengjemaure. Ved tidleg sprøyting kan ein få god verknad av MCPA + dinoseb. Andre effektive herbicid er linuron, terbutryn og nitrofen.

Å K E R G R Å U R T (*Gnaphalium uliginosum*) Korgplantefamilien

Sommareittårig ugras som formeirer og spreier seg berre ned frø. Åkergråurt er eit vanleg ugras i jordbruk og hagebruk, særleg på vassjuk jord. Finst over heile Sør-Noreg nord til Namdalen.

Åkergråurt kan motarbeidast ved grøfting og tynast med dei aller feste selektive herbicid.

M J U K T V I T A N N (*Lamium amplexicaule*) Lepeblomsterfamilien

Sommareittårig ugras som formeirer og spreier seg berre ned frø. Vanlig i hagar og åkrar, særleg på Sørlandet og Austlandet nord til V. Sildre og Nord-Fron. Finst elles spreidde stader på kysten nord til Finnmark. (*Lamium* har greina bladnerver. *Galeopsis* ugreina).

Mjuktvitann kan motarbeidast og tynast med dei same midla som raudtvitann.

T U N B A L D E R B R Å (*Matricaria matricarioides*) Korgplantefamilien

Sommareittårig ugras som formeirer og spreier seg berre ned frø. Tunbalderbrå har berre ca. 10 cm høge greina stenglar og mørkegrøne, snaue dobbeltfinna blad og kortskaftha korger utan kantkroner, men gulgrøne midtkroner i høg innhol topp. Planta har ei sterk aromatisk lukt.

Tunbalderbrå har spreidd seg over heile landet i dei siste hundre åra. Og er no eit svært vanleg ugras, særleg i tun, vegar og jernbaner, men også i planteskular, hagar og åkrar.

Motarbeiding og tyning

Ved sida av dei vanlege mekaniske tyningsmåtane, kan vi bruke visse kjemiske middel: Dinoseb og joksynil i blanding med fenoksysyrer er svært effektive. Av andre effektive herbicid har vi bromfenoxim, simazin, linuron, propaklor og amitrol. Prometryn, desmetryn, pyrazon, propanil, CIPC og diquat har middels verknad. Tunbalderbrå er resistent mot nitrofen og mineralolje.

T U N G R A S (*Polygonum aviculare*) Syrefamilien

Sommareittårig ugras som formeirer og spreier seg berre ned frø.

Tungras finst over alt i landet vårt, frå havet til over bjørkegrensa, og liker seg best på leirjord og fast grunn. Det spelar størst rolle som ugras i tun, hagegangar, vegar og gater, men finst òg i åker, eng og beite.

Stenglane er ofte sterkt greina, nedliggjande og seige. Rota er ei seig djuptgåande pålerot.

Motarbeiding og tyning

I kulturjord kan tungras haldast nede ved sterk gjødsling og tette kraftige grøder som skyggjer for ugraset. I open åker kan ein tyne tungras ved tidleg harving, radreinsking, hakking og luking. Unge planter er lette å tyne, medan eldre planter er særskilt vanskelege å tyne på grunn av dei seige, djuptgåande røtene.

Av kjemiske middel er 2,4-DP + joksynil, 2,4-DP + bromfenoxim og 2,4-DP + amitrol dei mest effektive. Simazin og prometryn ser ut til å vere meir effektive enn desmetryn og linuron.

På plassar som skal haldast fri for plantevækst vil alle tilrådde totalherbicid vera effektive mot tungras.

V I N D E L S L I R E K N E (*Polygonum convolvulus*) Syrefamilien

Sommareittårig ugras som formeirer og spreier seg med frø.

Vindelslirekne har kanta stengel som vinder seg opp etter kulturplantene. Dette ugraset gjer mest skade i vårkorn, der det filtrar saman loa og gjer haustearbeidet vanskeleg. Større mengd vindelslirekne kan og vere årsak til legde i åkeren.

Frøet spreier seg dels ved dryssing på marka og dels gjennom ureine såvarer og husdyrgjødsel.

Motarbeidning og tyning

Vindelslirekne motarbeider ein ved bruk av reint såkorn og ved å hindre at frøet kjem over i husdyrgjødsela.

Vindelslirekne er lettare å tyne med kjemiske middel enn tungras og hönsegras. MCPA + dinoseb og 2,4-DP ublanda har fullgod verknad. Simazin, desmetryn, linuron og nitrofen ser og ut til å vera effektive mot dette ugraset.

V A N L E G H Ö N S E G R A S (*Polygonum persicaria*) Syrefamilien

R A U D T H Ö N S E G R A S (*Polygonum lapathifolium*) Syrefamilien

G R Ö N T H Ö N S E G R A S (*Polygonum tomentosum*) Syrefamilien

Sommareittårige ugras som formeirer og spreier seg berre med frø.

Desse artene er nokså like å sjå til. Men dei kan skiljast ved at vanleg hönsegras har slirer med lange hår i kanten, utan kjertelhår på aksstilkane, medan både dei andre artene har kjertelhår på aksstilkane og om lag snaue slirer, utan eller berre med korte hår i kanten. Raudt og grønt hönsegras skil ein innbyrdes på fargen. Dessutan har grønt hönsegras lodne blad og stengel, medan raudt hönsegras har snaue blad, ofte med mørk flekk.

Alle desse hönsegrasa er vanlege åkerugras i Sør-Noreg, sjeldnare i Nord-Noreg. Vanleg hönsegras liker best kystklima. Hönsegras finst på alle slag jord, men trivst best på noko vassjuk mold- eller myrjord, og gjer seg mest gjeldande i poteter, rotvokstrar og grønsaker. Frøet spirer vanleg ikkje i modningsåret, men frø som har overvintra tørt eller i jorda, spirer snøgt om våren når det ikkje ligg djupare enn 5-6 cm. Frø som ligg djupare, bevarer spireevna i årevis.

Motarbeidning og tyning

Hönsegrasartene kan ein motarbeide ved grøfting av vassjuk jord og elles bruke dei vanlege rådgjerdene mot eittårige ugras for å hindre frøspreiing.

Halmluting drep ikkje frø av hönsegras. Spireprosenten blir jamvel høgare.

Hønsegrasartene kan tynast med ugrasharving, radreinsking og nokre få kjemiske middel. 2,4-DP verkar langt betre enn andre fenoksyssyrer. Det mest effektive i kornåker er 2,4-DP + joksynil og 2,4-DP + bromfenoxim. MCPA + dinoseb kan også gi brukbart resultat. I gulrot er mineralolje svært effektiv, men prometryn og linuron verkar godt ved sprøyting på frøbladstadiet. I potetåker vil linuron og propanil verke bedre enn dinoseb. Hønsegras er resistent mot propaklor og vanskeleg å tyne med desmetryn, nitrofen, pyrazon og amitrol.

S T O R E N G K A L L (*Rhinanthus major*) Maskeblomsterfamilien

S M Å E N G K A L L (*Rhinanthus minor*) Maskeblomsterfamilien

Sommareittårige ugras som formeirer og spreier seg berre med frø. Storengkall har større plante enn småengkall og kronrøyret er salrygga, medan det er rakt hos småengkall. Både to er halvsnytarar som kan gjere stor skade i gamal voll og naturleg eng og beite. Småengkall er vanleg på rå jord over heile landet. Storengkall er meir vanleg på Austlandet enn på Vestlandet og i Nord-Noreg. Frøet modnar tidleg, men må overvinstre for å kunne spire.

Motarbeidning ved å hindre frøspreiing og ved sterk gjødsling og god engkultur. Etter belgiske forsök er MCPA og 2,4-D svært effektive mot engkall.

S V A R T S Ö T V I E R (*Solanum nigrum*) Søtvierfamilien

Sommareittårig ugras som formeirer og spreier seg med svarte, giftige bær som inneholder mange frø. (Sjå og side 85).

Svartsøtvier er vertplante for potetkreft og potetål. Svært brysant ugras i hagekulturar og rotvokstrar og poteter. Trivst ikkje i kornåker eller andre grøder som dekkjer godt, fordi frøet spirer seint - for det meste i juni-juli.

I åkeren blir svartsøtvier spreidd med frø som drys på vekseplassen og med husdyrgjødsel. I hagebruk og planteskular kan frøet dessutan bli spreidd med kompost og planter som blir flytta ned jordklump. Fuglane spreier og ein del frø. Frøet kan ligge lange tider i jorda utan å miste spireevna. I eit amerikansk forsök spirte frø av *Solanum nigrum* med over 50% etter 39 års lagring i jorda.

Svartsötvier er eit vanleg ugras i Danmark og Sør-Sverige. I vårt land finst det meir spreidd i lågare strøk av Austlandet nord til Fåberg og Nordre Land og rundt kysten til Strinda og enkelte plassar i Nordland.

Motarbeiding og tynning

Over alt der svartsötvier viser seg bør ein fjerne plantene ved hakking og luking før dei rekk å setje frø.

Svartsötvier er motstandsför mot fenoksysyrer og dinoseb, men etter utanlandske oppgåver skal den kunne tynast med linuron, prometryn, desmetryn, nitrofen, propaklor, trifluralin og pyrazon.

S T I V D Y L L E (*Sonchus asper*) Korgplantefamilien

H A R E D Y L L E (*Sonchus oleraceus*) Korgplantefamilien

Sommareittårige ugras som formeirer og spreier seg berre med frø.

Dei eittårige dylleartene skil seg fra åkerdylle ved ikkje å ha krypande formeiringsrøter. Dessutan har dei mindre blomsterkorger, med snaue korgdekkblad, medan åkerdylle har gule kjertelhår både på begerblad og korgskift. Stivdylle har mørkgrøne brodd-tagga blad som oftast er heile. Haredylle har tunne, kålgrøne blad som oftast er finna med brei, trekanta endefinne og utan stikkande torntaggar i kanten.

Haredylle og stivdylle er nokså vanlege ugras over heile landet, unntake dei to nordlegaste fylka. Dei trivst best på sterkt gjødsla jord og i grønsaker og rotvokstrar, men finst også i andre åkergrøder og på avfallslassar.

Motarbeiding og tynning

Førebyggjande rådgjerder og mekaniske middel er det viktigaste. Dei er relativt sterke mot fenoksysyrer, men etter engelske forsök skal dei kunne tynast med dinoseb, linuron, prometryn og desmetryn.

L I N B E N D E L (*Spérgula arvensis*) Nellikfamilien

Sommareittårig ugras som formeirer og spreier seg berre med frø.

Linbendel er ved sida av meldestokk, dåarter og hönsegras det mest utbreidde sommareittårige ugras hos oss. Det finst særleg på lettare, sur, kalkfattig jord, og er aller verst i kyst- og fjellbygdene. Frøet modnar tidleg og fall lett på jorda, men det må vanleg overvintre før det spirer. Frøet kan elles ligge i jorda i mange år utan å misse spirevna.

Motarbeidning og tyning

Kalking av sur jord er ei viktig førebyggande rådgjerd. Elles gjeld det å hindre frøsetjing og frøspreiing ved mekanisk og kjemisk tyning av ugraset, brenning av melde og anna treskeavfall m.v.

Skal ein få eit godt resultat, må ein snarast mogleg etter at ugraset har spirt setje inn både mekaniske og kjemiske middel.

Linuron er svært effektiv mot linbendel. I kornåker tynte MCPA + linuron 99% i middel for 20 forsök, mot 80% for MCPA + dinoseb og 82% for trippelblandinga MCPA + 2,4-DP + joksynil. Amitrol og propaklor verkar også svært godt mot linbendel. Av andre herbicid med nokolunde brukbar verknad, kan nemnast simazin, desmetryn, terbutryn, nitrofen, lenacil, fenmedifam, trifluralin og diquat.

S M Å N E S L E (*Urtica urens*) Neslefamilien

Sommareittårig ugras som formeirer og spreier seg berre med frø. Smånesle kan vere eit brysamt ugras i hagar og tun, men og andre stader, særleg i og ved byar i heile landet.

Etter Weed Control Handbook skulle smånesle vere relativt lett å tyne med dei aller fleste herbicid.

Å K E R S T E M O R S B L O M (*Viola arvensis*) Fiolfamilien

Sommareittårig ugras som formeirer og spreier seg berre med frø.

Åkerstemorsblom er vanleg i heile landet nord til Nordland. Finst lokalt i Troms og Finnmark.

Åkerstemorsblom kan skiljast ut frå stemorsblom (*Viola tricolor*) på dei små og lyse blomstrane, med gule, ofte mest kvite kronblad som ikkje er lengre enn begerblada.

Motarbeidning og tyning

Dei same førebyggande rådgjerdene og mekaniske tyningsmåtane som for dei fleste andre sommareittårlige ugras.

Ved ugrassprøyting i kornåker har fenoksypropionsyrer + joksynil og MCPA + linuron gitt dei beste resultata. 2,4-DP åleine verkar avgjort bedre enn andre fenoksysyrer, og vel så bra som MCPA + dinoseb. I visse andre grøder er simazin, linuron og nitrofen dei mest effektive herbicid. Åkerstemorsblom er resistent mot desmetryn.

MINDRE VIKTIGE SOMMARETTÅRIGE UGRAS

- T A P P G Å S E B L O M (*Anthemis cotula*) Korgplantefamilien
G Å S E F O T (*Asperugo procumbens*) Rubladfamilien
B U S T H A V R E (*Avena strigosa*) Grasfamilien
V E G A R V E (*Cerastium glomeratum*) Nellikfamilien
A U G N E T R Ö S T (*Euphrasia spp.*) Maskeblomsterfamilien
V I L L B O K K V E I T E (*Fagopyrum tataricum*) Syrefamilien
V R A N G D Å (*Galeopsis bifida*) Lepeblomsterfamilien
D U N D Å (*Galeopsis ladanum*) Lepeblomsterfamilien
P E R U S K J E L L F R Ö (*Galinsoga parviflora*) Korgplantefamilien
S M Å K L E N G J E M A U R E (*Galium vaillantii*) Maurefamilien
P A D D E S E V (*Juncus bufonius*) Sevfamilien
F L I K T V I T A N N (*Lamium hybridum*) Lepeblomsterfamilien
V R A N G T V I T A N N (*Lamium moluccellifolium*) Lepeblomsterfamilien
T E V K A R S E (*Lepidium ruderale*) Krossblomsterfamilien
S V I M L I N G (*Lolium temulentum*) Grasfamilien (Sjå side 83)
S M Å K A T T O S T (*Malva neglecta*) Kattostfamilien
D V E R G K A T T O S I (*Malva pusilla*) Kattostfamilien
K A M I L L E B L O M (*Matricaria chamomilla*) Korgplantefamilien
V A S S R E P P E R (*Polygonum hydropiper*) Syrefamilien
E I T T Å R S K N A V E L (*Scleranthus annuus*) Nellikfamilien
K L I S T E R S V I N E B L O M (*Senecio viscosus*) Korgplantefamilien
V E G S E N N E P (*Sisymbrium officinale*) Krossblomsterfamilien
T O F R Ö V I K K E (*Vicia hirsuta*) Ertefamilien

II. VINTEREITTÅRIGE UGRAS

KVIT GÅSEBLOM (*Anthemis arvensis*) Korgplantefamilien

Vintereittårig ugras som formeirer seg og spreier seg berre med frø.

Kvit gåseblom minner mye om balderbrå, men skil seg frå denne ved å ha agner mellom midtblomstrane. Dessutan er blada mindre findelte enn hos balderbrå.

Kvit gåseblom er ugras i åker og eng, særleg i haustkorn og yngre kunsteng, på lettare kalkfattig jord. Finst mest på Austlandet og Sørlandet, sjeldnare vesta- og nordafjells.

Motarbeiding og tynning

Kvit gåseblom kan ein motarbeide og tyne på same måten som balderbrå. Vi har ingen norske forsök med kjemiske middel mot dette ugraset. Etter Weed Control Handbook skal kvit gåseblom kunna tynast med dinoseb, men ikkje med fenoksysyrer. Dei mest effektive herbicid elles skal vere simazin, prometryn, desmetryn, lenacil og pyrazon.

SANDSKRINNEBLOM (*Cardaminopsis arenosa*) Krossblomsterfamilien

Vintereittårig til fleirårig ugras som formeirer og spreier seg berre med frø. Kan kjennast på at den har finna rosettblad med stor endefinne, og både stjernehår og lange udelte hår, greina stengel og kvit, ofte til slutt bleikraud blomster.

Liksom stemorsblom trivst sandskrinneblom best på lett, sur, kalkfattig jord. Dette er eit ugras som har spreidd seg i dei seinare år, særleg på Sørlandet, men finst og i mange bygder på Austlandet, Vestlandet og i Nord-Noreg. Planta har bladrosett ved grunnen og tek stor plass når den kjem inn i åker og eng. Den finst i både vårsådde og haustsådde grøder, men kanskje mest i yngre kunsteng. Har ofte spreidd seg ved höysal.

Motarbeiding med kalk og ved å hindre frøspreiing. Då det er ei krossblomstra plante, er det sannsynleg at sprøyting med fenoksysyrer vil vere effektivt. Men vi har ingen forsök enno.

G J Ä T A R T A S K E (*Capsella bursa-pastoris*) Krossblomsterfamilien

Vintereittårig ugras som formeirer og spreier seg berre med frø. Gjærtartaske har mange former med ulike bladtyper. Blada har alltid stjernehår.

Gjærtartaske har evne til å overvintre på haustspirte planter på same måten som vassarve. Men frøet spirer ikkje så lett straks etter modninga som hos vassarve, og p.g.a. veksemåten er gjærtartaske mindre plagsam enn denne. Det er elles eit vanleg hage- og åkerugras over heile landet, på alle slag jord, både i vårsådde og haustsådde grøder.

Motarbeiding og tyning

Gjærtartaske kan vi motarbeide som sommareittårlige krossblomstra ugras i vårgrøder. Stubbharving og tidleg slodding som for vassarve.

Av dei kjemiske midla er fenoksyssyrer og dinoseb svært effektive, men gjærtartaske går ikkje fullt så lett for desse midla som andre eittårlige krossblomstra ugras. Dei mest effektive herbicid elles er simazin, prometryn, terbutryn, linuron, lenacil, pyrazon, fennmedifam, propaklor, propanil, CIPC og diquat. Nitrofen derimot tyner berre halvparten av plantene.

K O R N B L O M (*Centaurea cyanus*) Korgplantefamilien

Vintereittårig ugras som formeirer og spreier seg berre med frø.

Kornblom var vanlegare før i vårt land, men finst enno i lågare strøk av Austlandet og Sørlandet, og langs kysten til Alta. På avfallsplasar og forvilla frå hagar kan ein òg finne dette ugraset.

Kornblom er eit svært brysamt ugras i Danmark og Sør-Sverige, særleg i haustkorn og førsteårseng. Spreier seg mest med frøkasting på marka og elles med husdyrgjødsel og ureine såvarer.

Motarbeiding og tyning

Motarbeiding ved bruk av reint såkorn og ved å unngå frøkasting på marka. Tyning ved godt reinhald i radreinska vokstrar og sprøyting i kornåker. Harving og tromling av stubbåkeren kan lokke frøet til å spire om hausten, slik at ugraset blir drepe av jordarbeidingsa seinare.

Kornblom skal vera lett å tyne ved sprøyting med fenoksyeddiksyrer.

V A N L E G A R V E (*Cerastium caespitosum*) Nellikfamilien

Vintereittårig til fleirårig plante som er vanleg i heile landet, men ikkje særleg brysam som ugras i åker og eng. Plantene liknar vassarve, men kan skiljast på at vanleg arve er tett håra over det heile, medan vassarve har hår berre på den eine sida av stengelen. Dessutan har dei 5 stjerneforma, kvite kronblada hos vanleg arve berre eit hakk i toppen, medan dei hos vassarve er kløyvde mest heilt ned.

Vanleg arve formeirer og spreier seg mest berre med frø.

Motarbeiding og tyning

Vanleg arve blir motarbeidd ved bruk av reint engfrø, ugrasrein gjødsel og andre førebyggande rådgjerder for å hindre spreiling av ugrasfrø.

I kornåker kan ein tyne dette ugraset ved ugrasharving før kornet spirer, og ved sprøyting med fenoksypropionsyre etter spiring.

Godt reinhald i radreinska vokstrar er den sikraste tyningsmåten. Vanleg arve skal elles kunne tynast med mineralolje, CIPC, linuron og prometryn.

T R A N E H A L S (*Erodium cicutarium*) Storkenebbfamilien

Vintereittårig ugras som formeirer og spreier seg berre med frø.

Lodden plante med ofta liggjande knebøygd stengel og mjuke finna blad med findele småblad. Raudfiolett 5-tals blomster og delfrukter med lang lodden knebøygd nebb som nedanfor kneet er snodd som ein korketrekkjar.

Åkerugras på søre Austlandet og elles inne i fjordane på Vestlandet og i Trøndelag. Trivst best på lett, tørr og kalkrik jord.

Motarbeiding og tyning

Dette tette hålaget gjer dette ugraset vanskeleg å tyne med bladherbicid. Dei viktigaste motmidla er derfor reine såvarer, ugrasharving og gjennomförd radreinskning.

R A U D T V I T A N N (*Lamium purpureum*) Lepeblomsterfamilien

Vintereittårig ugras som formeirer og spreier seg berre med frø.

Planta har greina bladnerver og sterkt lukt. Blomsteren er purpurraud.

Raudtvitann er eit nokså vanleg hage- og åkerugras over heile landet nord til Lofoten. Liker sterkt gjødsla jord. Det er enda vanskelegare å unngå sjølvsåing enn for dåartene.

Motarbeiding og tynning

Førebyggjande rådgjerder som for dåartene.

I kornåker er 2,4-DP meir effektiv enn MCPA og MCPP, men ikkje effektiv nok. Dinoseb og joksynil verkar betre. Bruk MCPA + dinoseb i attlegg med kløver og trippelblandinga MCPA + 2,4-DP + joksynil i all anna kornåker. I krossblomstra kulturar er trifluralin, nitrofen og propaklor svært effektive. I potetåker har linuron og terbutryn brukbar verknad. Prometryn er fullt like god som linuron i gulrot.

H A R E M A T (*Lapsana communis*) Korgplantefamilien

Vintereittårig ugras som formeirer og spreier seg berre med frø. Haremat finst både på dyrka og udyrka mark heilt nord til Finnmark. Plantta kjenner ein på at det er mange små langstilka korger i halvskjerm, og om lag 10 lysgule og berre tungeforma kroner i kvar korg. Korgdekkblada er stive, rake, grøne og snaue. Stengelen er grann og greina ned tunne lysgrøne blad, dei nedre med nokre små finnar og stor grovtagga endefinne.

Frøet er vanskeleg å reinse frå grasfrø og ein kan få dette ugraset inn i enga med ureine såvarer. Det er elles eit åkerugras som ofte blir spreidd vidare med melde og avrens som kjem over i husdyrgjødsla.

Motarbeiding og tynning

Førebyggande rådgjerder som for andre eittårige ugras. Då frøet av haremat er spireført straks etter modning, vil stubbharving med ei lett harv gi gode spirevilkår, slik at ugraset kan bli tynt ved seinare pløyning.

Haremat er resistent mot MCPA. Einsidig bruk av dette ugrasmiddel har ført til at haremat har teke seg sterkt opp mange stader. MCPP, dinoseb og joksynil har relativt god verknad. Bruk dinoseb i attlegg med kløver og MCPP + dinoseb eller MCPA + 2,4-DP + joksynil i annan kornåker. Amitrol i havre er svært effektiv mot haremat.

Å K E R M I N N E B L O M (*Myosotis arvensis*) Rubladfamilien

Vintereittårig ugras som formeirer og spreier seg berre med frø.

Åkerminneblom er eit vanleg ugras over heile landet nord til Målselv, både i vårsådde og haustsådde grøder og i førsteårs eng. Men det finst også i eldre kunsteng og i naturleg grasmark.

Motarbeiding med radreinsking og kjemiske middel. Dinoseb er svært effektiv mot dette ugraset som er vanskeleg å tyna med andre herbicid. Fenoksysyrer + joksynil, linuron og amitrol kan gi brukbart resultat.

K O R N V A L M U E (*Papaver rhoeas*) Valmuefamilien

Vintereittårig ugras som formeirer og spreier seg berre med frø.

Kornvalmue er eit vanleg ugras i kornåker (særleg haustkorn) i Danmark og Sør-Sverige. I vårt land speler dette ugraset ingen rolle. Men plantata finst ofte på avfallspllassar og ved vegar og jernbanar. Kjem av og til ut i åkeren med husdyrgjødsel etter fôring med innført kraftfôr. Noko av frøet kan gå gjennom dyra utan at spireevna blir øydelagt.

Kornvalmue kan ein motarbeide og tyne på same måten som kornblom.

T U N R A P P (*Poa annua*) Grasfamilien

Tunrapp er eit vintereittårig lysgrønt, lågvakse gras i små tuver. Det formeirer og spreier seg berre med frø og sundrevne tuver. Tunrapp er svært hardfôr. Haustspalte planter blomstrar tidleg om våren, og frøet spreier seg lett med vinden. Spiring, blomstring og frøsetjing går for seg heile året når det ikkje er frost.

Tunrapp kjem inn overalt, både på dyrka og udyrka mark, der plassen ikkje er oppteken av andre planter. Det er eit vanleg ugras over heile landet, og er særleg brysant i tun, hagar, på vegkantar, idretts- og leikeplassar o.l., men finst også svært ofte i åker og eng og anna grasmark. Ved skurtresking vil storparten av tunrappfrøet bli blåse utover åkeren saman med agnene.

Motarbeiding og tynning

I grønsaker, rotvokstrar og poteter og andre radkulturar kan tunrapp tynast mekanisk ved radreinsking, hakking og luking i tørt ver. I vått ver og på rå jord har tuvene svært lett for å slå rot att.

Dei mest effektive herbicida er simazin, pyrazon, lenacil og CIPC. Men ein kan også få god verknad av terbutryn, linuron, propaklor, trifluralin, mineralolje, amitrol og paraquat.

På plassar som skal haldast fri for all vegetasjon vil alle totalherbicid i tilrådde mengder vera effektive mot tunrapp.

Å K E R S V I N E B L O M (*Senecio vulgaris*) Korgplantefamilien

Vintereittårig ugras som formeirer og spreier seg berre med frø. Åkersvineblom er vanleg i heile landet, særleg på næringsrik jord, og er eit av våre mest brysame ugras i hagar, gartneri og planteskular, men finst også i åkergrøder. Planta blomstrar og set frø utover heile sommaren og hausten. Frøet har fnokk og blir lett spreidd med vinden. Det kan gro straks etter modninga.

Motarbeidning og tynning

Påpasseleg ugrasharving og radrensing er viktig for å halda dette ugraset nede. Dessutan har vi no mange gode kjemiske middel. MCPA + dinoseb og fenoksysyrer + joksynil er svært effektive. Andre effektive herbicid er simazin, prometryn, linuron, pyrazon, lenacil, fenmedifam, nitrofen og propaklor. Åkersvineblom er resistent mot CIPC og mineralolje.

V A S S A R V E (*Stellaria media*) Nellikfamilien

Vassarve er vintereittårig og eit av våre mest brysame ugras i alle slag grøder som blir dyrka i open jord. Den finst og ofte i eng, beite og anna grasmark. Planta har krypande stenglar som slår røter ned statte mellomrom, og lagar tette matter ned ei utruleg evne til å trengje vekk kulturplantene.

Vassarve er sterkt avhengig av jamn og rikeleg råme i jordoverflata, og er difor verst i rått og kjøleg kystklima, men kan også ta overhand i innlandsbygdene i kalde og våte år, særleg på vassjuk jord og i halvskugge. Vassarve kan blomstre og setje frø heile året når det ikke er frost.

Frøproduksjonen er rikeleg, i medel 15.000 frø pr. plante, og frøet gror relativt lett straks etter modning. Haustspira planter overvintrar i haustkorn og attleggsåker m.v. og set frø alt i mai året etter. Når

dette frøet fell på jorda, kan ein del spire og lage ein ny generasjon same året. Frø som har lege i jorda og kjem opp i spiresjiktet (0-3 cm) under vårarbeidninga, eller blir tilfört med gjødsel og såvarer, gror snøgt om våren, og plantene avsluttar da veksten om hausten.

Motarbeiding og tyning

Der vassarve har laglege veksevilkår, er den vanskeleg å tyne. Det er svært viktig at ugrasharving og hakking blir gjort så tidleg og ofte at dei krypande stenglane ikkje får røta seg, da attståande leddknutar med røter lever vidare og set nye skot. Av same grunn er hakking oftest meir effektiv enn handluking. I potetåker, før spiring, har det vist seg bra å drille opp først og slette drillane etterpå med ugrasharv kjørt med ramma ned. Stubbharving tidleg om hausten og slodding tidleg om våren, for å få mest mogleg frø til å spire så det kan bli øydelagt under jordarbeidninga seinare, skulle vere særleg aktuelt for dette ugraset.

Elles er alle vanlege rådgjerder som tek sikte på å hindre frøkasting og frøspreiing på den eine sida, og å auke konkurransen hos kulturvokstrane på den andre, særleg viktig når det gjeld å motarbeide vassarve. Grøfting av vassjuk jord gjer det lettare å tyne vassarve med mekaniske middel.

Vi har no ei lang rekke svært effektive herbicid mot vassarve: Fenoksypropionsyrer (MCPP og 2,4-DP) ublanda eller blanda med joksynil, MCPA + dinoseb, MCPA + linuron, linuron åleine, alle triazin, CIPC og mineralolje tyner alle 90% eller meir av vassarven. Propanil, propaklor, lenacil, fenmedifam, trifluralin, amitrol og diquat verkar og godt.

Vassarve er dverre resistent mot nitrofen.

P E N G E U R T (*Thlaspi arvense*) Krossblomsterfamilien

Vintereittårig ugras som formeirer og spreier seg berre med frø.

Pengeurt er svært vanleg i Sør-Noreg, vanleg til Troms, særleg i dei indre dalföra, sjeldan i Nord-Noreg. Verst på lettare jord, i poteter, rotvokstrar og grønsakkvokstrar, men finst og ofte i korn og andre grøder. I milde vintrar kan planta overvintre t.d. i haustkorn eller attleggsåker.

Dette ugraset veks snøgt og modnar tidleg, slik at det blir mye frøspille på åkeren, og ein del kan og spire same året. Frø som har overvintra i jorda gror svært snøgt om våren. Heile planta, og særleg frøet, har vond laukliknande lukt som kan setje smak på mjølk og smør.

Motarbeiding og tyning

Motmidla er dei same som for åkersennep.

I kornåker kan ein motverke pengeurt med sterk gjødsling. Frøet blir sterkt skadd ved halmlutting.

Pengeurt er lett å tyne ned med mange kjemiske middel. MCPA og andre fenoksysyrer tyner nesten 100 prosent. Det same gjeld dinoseb åleine eller i blanding med MCPA. Dei mest effektive herbicid elles er propanil, prometryn, terbutryn og især linuron. Amitrol, fenmedifam, diquat og mineralolje er og fullgode våpen mot pengeurt. Den er derimot relativt sterkt mot pyrazon, nitrofen og propaklor.

STEMORSBLØM (*Viola tricolor*) Fiolfamilien

Vintereittårig til fleirårig ugras som formeirer og spreier seg berre med frø. Stemorsblom er vanleg i heile landet, særleg på lettare, sur, kalkfattig jord både på dyrka og udyrka mark. Kan vere brysamt ugras både i eng, åkrar og hagar.

Motarbeidast ved kalking og ved å hindra frøspreiing. Når det gjeld kjemiske middel: sjå åkerstemorsblom.

MINDRE VIKTIGE VINTEREITTÅRIGE UGRAS

HUNDEPERSILLE (*Aethusa cynapium*) Skjermplantefamilien (Sjå s. 80)

KLINTE (*Agrostemma githago*) Nellikfamilien (Sjå side 80)

ÅKERKVEIN (*Apera spica-venti*) Grasfamilien

TAKHAUKESKEGG (*Crepis tectorum*) Korgplantefamilien

ÅKERSTORKENEBB (*Geranium dissectum*) Storkenebbfamilien

VILLROT (*Hyoscyamus niger*) Søtvierfamilien (Sjå side 82)

MARKKARSE (*Lepidium campestre*) Krossblomsterfamilien

ÅKERSTEINFRØ (*Lithospermum arvense*) Rubladfamilien

TUNBENDEL (*Spergula rubra*) Nellikfamilien

ÅKERVERONIKA (*Veronica agrestis*) Maskeblomsterfamilien

LODNEVIKKE (*Vicia villosa*) Ertefamilien

BERGFLETEVERONIKA (*Veronica hederifolia*) Maskeblomsterfamilien

ORIENTVERONIKA (*Veronica persica*) Maskeblomsterfamilien

III. TOÅRIGE UGRAS

LODNEFAKS (*Bromus mollis*) Grasfamilien

RUGFAKS (*Bromus secalinus*) Grasfamilien

Toårige ugras som formeirer og spreier seg berre med frø. Rugfaks og lodnefaks lager berre ein liten bladtust første året, og blomstrar og set frø tidleg andre året. Båe arter er vanlege i Sør-Noreg - rugfaks mest i haustkorn på Austlandet og i Trøndelag, og lodnefaks mest i enga, særleg i kyststrøk på Sør- og Vestlandet.

Motarbeidning

Lodnefaks og rugfaks blir motarbeidd ved å hindre frøspreiing og ved bruk av reine såvarer og ugrasrein gjødsel, - lodnefaks dessutan ved tidleg slått av enga.

Rugfaks var før eit leitt ugras i haustkorn, og blei rekna som "vondartata" etter såvarelova. Finst no mest berre på avfallslassar hist og her.

MYRTISTEL (*Cirsium palustre*) Korgplantefamilien

VEGTISTEL (*Cirsium vulgare*) Korgplantefamilien

KRUSETISTEL (*Carduus crispus*) Korgplantefamilien

Toårige ugras som formeirer og spreier seg berre med frø.

I spirlingsåret lagar dei berre rot og ein stor bladrosett. Andre året blomstrar dei og set frø. Deretter døyrt heile planta.

Alle desse toårige tistelartene har vengekanta stenglar og kan lett skiljast frå åkertistel som ikkje har vengekanta stengel. Carduus skil ein frå Cirsium på at den har fnokk med hårstrålar og agner mellom blomstrane, medan Cirsium har fnokk med fjørstrålar. Vegtistelen har elles 3-4 cm breie korger mot 1 cm hjå myrtistelen. Myrtistelen har og mye høgare planter og er oftast litt raudbrun i fargen. Vegtistelen har dei lengste og kvassaste tornane av alle desse tistelartene.

Dei to sistnemnde kan vere leie ugras i beitemark og naturleg eng, myrtistelen mest på grasmyr og vassjuk fastmark, og vegtistelen på tørrare stader, særleg på veg- og grøftekantar. Krusetistelen finn ein helst i yngre eng og i åker som blir därleg arbeidd. Alle arter er vanlege over heile Sør-Noreg og eit stykke opp i Nord-Noreg.

Motarbeidning

Myrtistelen blir motarbeidd med grøfting. Elles er avhogging eller oppstikking av 2. årsplantene før frøsetjing eller sprøyting med MCPA dei viktigaste rådgjerdene.

G U L R O T (*Daucus carota*) Skjermplantefamilien

Den viltveksande forma av gulrot er eit to-årig ugras, som i vårt land finst berre her og der i dei lågare delane av Aust- og Sørlandet og i Hardanger og Sogn.

Planta har grann trehard rot, findelte blad og kantut stivhåra stengel og storsveip med finna blad.

Villgulrota kryssar med dyrka gulrot, og kan gjere stor skade ved avl av gulrotfrø.

I Danmark og Sør-Sverige er gulrot eit plagsamt ugras særleg i kunsteng. Den veks dessutan ofte på vegkantar, jernbaneskråningar og på tørre, faste bakkar utanom kulturjorda. Gulrot liker best kalkrik jord.

Motarbeidning og tyning

Då gulrota formeirer og spreier seg berre med frø, er det særskilt viktig å hindre dette ved n.a. å slå før avblomstring, og å bruke reint såfrø ved attlegg til eng.

Gulrot kan tynast med fenoksypropionsyrer, men er relativt motstandsfor.

B A L D E R B R Å (*Matricaria inodora*) Korgplantefamilien

To-årig ugras som formeirer og spreier seg berre med frø.

Balderbrå er over heile landet eit av dei mest plagsame ugrasartene i haustkorn og første års eng på alle slag jord. Frøet spreier seg gjenom husdyrgjødsel og med timotei og blanda frø som er vanskelege å reinse for balderbråfrø. ("vondarta" etter såvarelova). Frøproduksjons-
evna er kolossal. Krafige planter kan lage 1/4 million frø. Frøet gror best når det ligg oppå jorda, eller nedmolda til maks. 0,5 cm. I spiringssåret utviklar planta berre rot og ein liten bladrosett.

Motarbeidning og tyning

Tidleg slått av førsteårsenga, handreinsking av frøfelt og bruk av rei-

ne såvarer og kunstgjødsel til attlegg og haustkorn, er dei viktigaste førebyggande rådgjerdene. Treskeavfall og höymo må ein ikkje bruke til strøy eller kaste i gjødsla. Brenn det!

I attleggsåker med kløver kan ein tyne balderbrå ved sprøyting med MCPA + dinoseb. I haustkorn kan ein sprøyte tidleg om våren med trippelblandinga MCPA + 2,4-DP + joksynil og i frøeng med 2,4-D amin + dinoseb. Overvintra balderbrå er vanskeleg å tyne og ein må sprøyte straks veksten tek til når plantene er ca. 5 cm høge. Overlevande planter i frøeng må ein luke bort.

I visse andre grøder kan balderbrå tynast med simazin, prometryn, terbutryn, linuron, pyrazon, propaklor og amitrol. Balderbrå er oljeresistent.

DIKESVINEBLOM (*Senecio aquaticus*) Korgplantefamilien

Toårig ugras som formeirer og spreier seg berre med frø. Dikesvineblom liknar landøyda, men kan skiljast frå denne på at dei nedre blada er heile, medan dei er finna hos landøyda. Dikesvineblom har få store korgar og berre snaue frø. Landøyda har håra skivefrø. Dikesvineblom skal vere minst like giftig som landøyda. (Arne Hjelle: "Senecioalkaloidenes toxicologi med eksperimentelle undersøkelser over *Senecio aquaticus*". - Hovedoppgåve N.V.H. 1956). Det er eit plagsamt ugras i våt grasmark på Sunnmøre (både i eng og beite) og finst spreidd andre stader i landet og. Det er særleg storfe som er utsett for forgiftning. Dels akutt og dels kronisk. Dyra kan krepere fleire veker til månader etter at ein har slutta å føre med høy som inneheld dikesvineblom. På Sunnmøre strauk det med 30-40 dyr for året i 1950-åra. (Sjå og side 84).

Motarbeidning skjer på same måte som for landøyda. Sprøyting med 2,4-D ester når plantene har utvikla store bladrosettar, har gitt best resultat.

MINDRE VIKTIGE TOÅRIGE UGRAS

KNEREVERUMPE (*Alopecurus geniculatus*) Grasfamilien

STORBORRE (*Arctium lappa*) Korgplantefamilien

SMAÅBORRE (*Arctium minus*) Korgplantefamilien

ULLBORRE (*Arctium tomentosum*) Korgplantefamilien

K V I T D O D R E (*Berteroa incana*) Krossblomsterfamilien

Å K E R F A K S (*Bromus arvensis*) Grasfamilien

E N G K L O K K E (*Campanula patula*) Klokkefamilien

K A R V E (*Carum carvi*) Skjermplantefamilien

G I F T K J E K S (*Conium maculatum*) Skjermplantefamilien (Sjå side 81)

R E V E B J Ö L L E (*Digitalis purpurea*) Maskeblomsterfamilien (Sjå side 82)

V A N L E G M Y R K L E G G (*Pedicularis palustris*) Maskeblomsterfamilien

G A F F E L S M E L L E (*Silene dichotoma*) Nellikfamilien

G E I T E S K J E G G (*Tragopogon pratensis*) Korgplantefamilien

IV. FLEIRÅRIGE STADBUNDNE UGRAS

a. Med trevlerot

S Ö L V B U N K E (*Deschampsia caespitosa*) Grasfamilien

Fleirårig stadbunde ugras som formeirer og spreier seg berre med frø. Sølvbunke er ved sida av engsoleie det vanlegaste og mest brysame ugraset i dyrka beiter over heile landet. Avgjort verst på sidlendt og vasssjuk jord, der plantene lagar store tuver som dyra vraker.

Motarbeiding og tyning

Sølvbunke kan ein motarbeide med grøfting og ved beiting i rett tid med god avbeiting, særleg med hest. Da planta formeirer og spreier seg berre med frø, må ein hindre frøsetjing ved å slå ned dei stråa som står att etter kvar avbeiting. Frøet modnar i juli-september, og spirer lett haust eller vår, sjølv om det ligg oppå jorda. Tuvene bør elles hakkast av og ryddast bort etter kvart som dei viser seg. Ein bør da så engfrø i sårfletene. Best er det å pløye eller frese og så i på nytt når sølvbunken har teke overhand. Er det svært mye store tuver, kan det bli naudsynt med flåhakking først, eller planering med traktorskyffel.

Sølvbunke kan og lett drepast med natriumklorat: 15-20 kg/dekar jamt over det heile om hausten etter at beitedyra er innsette. Denne mengda ser ut til å verke selektivt - sølvbunke går til grunne, medan engrapp, raudsvingel, engsvingel og kvitkløver klarer seg.

Dersom arbeidet er overkomeleg, er det best å sprøyta kvar einskild tuve med natriumklorat eller dalapon. Bruk 20% oppløysing av begge kjemikala og 30-60 ml pr. tuve for natriumklorat og 5-10 ml for dalapon. Dalapon er svært effektiv mot sølvbunke, men det drep og andre grasarter, så sprøyt berre på tuvene. Men det er viktig å fordela væska godt over heile tuva. Det kan bli naudsynt å fjerna daude tuver med flåhakke og å så i beitefrø. Men som regel vil tuvene snart bli overgrodd av engrapp og kvitkløver.

F Ö L B L O M (*Leontodon autumnalis*) Korgplantefamilien

Fleirårig stadbunde ugras som formeirer og spreier seg berre med frø. Følblom er vanleg over heile landet som ugras i kunsteng, natureng, beite, plenar og på veg- og frøftekantar o.l. stader. Finst på alle slag jord, men trivst best på leirjord.

Motmidia er dei same som for lövetann. Følblom er svært lett å tyne med MCPA og 2,4-D.

B L Å K O L L (*Prunella vulgaris*) Lepeblomsterfamilien

Fleirårig stadbunde ugras som formeirer og spreier seg mest berre med frø. Men stenglane er noko nedliggende og kan slå røter frå leddknutane. Blåkoll er vanleg ugras i alle slag grasmark og til dels i åker, særleg på noko rå jord. Finst i heile landet til Troms. Det modne frøet sit fast i frøhamsen og det meste følgjer med grøda i hus, og blir spreidd ut att med dyregjødsel og ureint engfrø. Blåkollfrø er det mest uråd å reinse frå timoteifrø.

Motarbeiding ved grøfting, reint såfrø og bruk av kunstgjødsel ved attlegg til eng eller plen. Blåkoll kan ein tyne med 2,4-D.

E N G S O L E I E (*Ranunculus acris*) Soleiefamilien

Fleirårig stadbunde ugras som formeirer og spreier seg berre med frø. Engsoleie har trevlerot som lever i fleire år, men er utan vegetativ formeiringsevne. Blomstrar og set frø i juli-august. Frøet gror relativt sikt etter tørr lagring, snøggare etter overvintring i jord eller gjødsel. Engsoleie er eit av dei vanlegaste ugrasa i kulturbeite, naturleg eng og eldre kunsteng over heile landet. Særleg brysam i nordlege kyststrøk og på vassjuk jord. Den veks også på tørr jord. På stader med veik drift kan ein også finne den i åkeren. Engsoleie er noko giftig i rå tilstand, men ikkje etter tørking. (Sjå side 83).

Motarbeiding og tyning

Dei viktigaste motmidla er å hindre frøsetjing og frøspreiing ved å slå tidleg, seinast når ugraset tek til å blomstre. Halvmodent frø er spireført. På beite er beiting i rett tid og god avbeiting, særleg med sau, viktig. I tett plantedekke har dyra noko vanskeleg for å skilje ut engsoleia før ho tek til å blomstre. Planter som står att kan ein slå ned med ljå. Andre middel er ompløyting og god jordkultur i åkeren og attlegg med reint såfrø og ugrasfri gjødsel.

Sprøyting med MCPA under den sterkeste veksten før blomstring er svært effektivt mot engsoleie. Andre fenoksysyrer og benzoesyrer verkar avgjort dårlegare enn MCPA.

b. Med rotstokk

G U L G Å S E B L O M (*Anthemis tinctoria*) Korgplantefamilien

Fleirårig stadbunde ugras som formeirer og spreier seg mest berre med frø. Ved oppdeling av rotstokken ved jordarbeidina kan ein og få vegetativ formeiring. Ugras i kunsteng på varm kalk- og leirskiferhaldig jord i Sør-Noreg, særleg på Austlandet opp til Gudbrandsdal og Røros. Trivst ikkje på sur jord eller i kaldt, rått klima. Frøet er "vondarta" etter såvarelova.

Motarbeiding

Ein kan bruke dei same rådgjerder som mot prestekrage, men skal dessutan kunne tynast med 2,4-D ester.

B U R O T (*Artemisia vulgaris*) Korgplantefamilien

Fleirårig stadbunde ugras som formeirer seg mest berre med frø. Burot er mest buskforma, 1-1,5 m høg, sterkt greina og har ein kraftig rotstokk med vegetativ formeiring ved oppdeling. Denne evna har og den nedre delen av stengelen som er rotståande. Stengelen er treaktig hard. Frøproduksjonen er kolossal: 50-700 tusen frø pr. plante. Frøet spiser best oppå jorda. Ugras i åker og eng, særleg langs vegar, gjerde o.l. Vanleg berre på Austlandet, men finst inne i fjordane på Vestlandet. Trivst best på varm silurjord og andre lettare jordarter.

Motarbeiding.

Burot kan ein motarbeide ved avhogging før blomstring, oppstikking av rotstokken eller oppløyning og dyrking av poteter eller rotvokstrar. Burot kan ein tyne med natriumklorat og fenoksyeddiksyrer.

E N G K A R S E (*Cardamine pratensis*) Krossblomsterfamilien

Fleirårig stadbunde ugras som formeirer og spreier seg med frø. Vanleg ugras på våte enger over heile landet, men verst i dei sør-vestlege landsdelane. Blomstrar i mai, og planta visnar ned etter frøsetjing i juni, unnateke rotblada og den fleirårlige rotstokken. Formeirer seg vegetativt med yngleknoppar i hjørna på småblada.

Grøfting og god engkultur er dei viktigaste rådgjerdene. Kan tynast med MCPA.

P R E S T E K R A G E (*Chrysanthemum leucanthemum*) Korgplantefamilien

Fleirårig stadbunde ugras som formeirer og spreier seg berre ned frø.

Prestekrage har ein opptil 10 cm lang skråttliggjande rotstokk som kan setje nye skot frå adventivknoppane ved oppdeling, men elles ikkje.

Den nedste delen av stengelen er nedliggjande og rotslåande. Vanleg ugras både i kunsteng og naturleg grasmark, frå havet til bjørkegrensa, over heile landet nord til Nordland, sjeldnare i Troms og Finnmark. Veks på lettare, tørr skrinn jord, gjerne saman med småsyre. Frøet modnar ofte før kløver og timotei, og spirer godt like etter modninga. Det er vanskeleg å reinse frå timotei- og blandfrø. Prestekrage blir rekna som "vondarta" etter såvarelova.

Motarbeiding

Reint såfrø, ugrasrein gjödsel, god jord- og engkultur og tidleg slått er førebyggande rådgjerder. Har prestekraken teke overhand i kunstenga, må ein pløye om og tyne ugraset i radreinska vokstrar. Auxin-herbicid har ingen verknad på dette ugraset.

G R O B L A D (*Plantago major*) Kjempefamilien

S M A L K J E M P E (*Plantago lanceolata*) Kjempefamilien

D U N K J E M P E (*Plantago media*) Kjempefamilien

Fleirårige, stadbunde ugras som formeirer og spreier seg berre med frø.

Vanlege ugras i tun, hagegangar, plenar, eng og beite på vegkantar o.l. stader. Groblad er vanleg over heile landet nord til Loppa, Talvik og Alta. Dei andre to finst meir spreidd over Austlandet og i kyststrøk. Smalkjempe og dunkjempe liker seg best på tørre bakkar. Groblad og smal-kjempe har ein stutt rotstokk. Dunkjempe har pålerot.

Motarbeiding og tyning

Bruk ugrasreint plenfrø og engfrø. I plenar og anna grasmark er særleg groblad svært lett å tyne med fenoksyddiksyrer. 2,4-D er litt betre enn MCPA.

På stader som ein skal halde fri for all plantevækst, kan ein bruke eit av dei mange total-herbicid. Groblad og løvetann er som regel dei første planteartene som vandrar inn etter tyning av all vegetasjon med monuron eller triazin. Ein bør da sprøyte med 2,4-D.

Grobladfrøet blir øydelagt i AIV-silo.

LANDÖYDA (*Senecio jacobaea*) Korgplantefamilien

Fleirårig stadbunde ugras som formeirer og spreier seg berre med frø. Vanleg beiteugras på Sør- og Vestlandet, særleg i Rogaland og Hordaland. Mest på lettare jord i natureng og beitemark, på vegkantar og anna udyrkka mark. Grov giftig korgblomstra plante med stutt rotstokk. Produserer store mengder fnokkerande frø som spreier seg lett med vinden.

Motarbeiding

Ein bör hogge av planta før frøsetjing. Landøyda kan tynast ved oppspaping av rotstokken eller individuell handsaming med natriumklorat (10-20 g). Fenoksysyrer, særleg 2,4-D ester er effektive etter norske forsök.

Planta er årsak til forgiftning av husdyr ("Sirasjuka"). Inneheld alkaloida jacobin, jacodin og senecionin som øydelegg levra og skader tarmkanalen. (Sjå side 84).

c. Med pålerot

VINTERKARSE (*Barbarea vulgaris*) Krossblomsterfamilien

Fleirårig stadbunde ugras som formeirer og spreier seg mest berre med frø. Rotbitar kan setje nye skot frå adventivknoppar, men denne formeiringsmåten speler lita rolle. Vinterkarse er eit leitt ugras over heile landet. Planta liknar åkersennep, men blada er glatte og har overvintrande bladrosett ved grunnen. Pålerota går djupt og er sterkt greina. Frøspreiing er det vanlege, særleg gjennom ureint engfrø og med husdyrgjödsel. Frøet har om lag same form og storleik som frø av alsikekløver, og er difor vanskeleg å reinse frå dette og blandfrø. Det er heller ikkje lett å reinse frå timotei, og blir rekna som "vondarta" etter såvarelova. Dyra vrakar planta både frisk og tørr. Vinterkarsefrøet har difor lett for å kome over i gjödsla med fôrrestar.

Motarbeiding

Ein kan nytte dei same førebyggjande rådgjerdene som mot höymole. Vinterkarse kan tynast ved sprøyting med fenoksysyrer før blomstring.

R U S S E K Å L (*Bunias orientalis*) Krossblomsterfamilien

Fleirårig stadbunde ugras som formeirer og spreier seg med frø. Planta har gul blomster og sterkt greina meterhøg stengel, ofte over 1½ m lang, grov pålerot med fleire hovud. Rota har vegetativ regenerasjonsevne ved avskjering. Rotblada liknar höymoleblad, men har sterk, emmen lukt. Planta kjenner ein elles lett på dei stutte, skeive og knutrete 1-2-frøa skulpene som ikkje opnar seg. Dette farlege ugraset er innfört (oppheveteleg frå S. Russland) og held på å spreie seg, særleg kring Oslo og andre stader Austafjells. Finst og utmed kysten nordover til Sogn. Trivst best på leirjord.

Russekål bør en tyne ved å dusje kvar plante grundig med 2,4-D ester så snart den viser seg.

H Ö Y M O L E (*Rumex domesticus*) Syrefamilien

K R U S H Ö Y M O L E (*Rumex crispus*) Syrefamilien

B Y H Ö Y M O L E (*Rumex obtusifolius*) Syrefamilien

Fleirårige, stadbundne ugras som formeirer og spreier seg mest berre med frø. Men alle har ei lang, greina pålerot som kan setje nye skot frå groper i borklaget når rota blir skadd eller oppdelt, t.d. ved pløyning.

I vårt land er höymole eit vanleg og ytterst brysamt ugras i eng, beite og anna grasmark over heile landet. Da det lett vil bli mye höymolefrø i husdyrgjødsel der ein har mye av dette ugraset i enga, finst den og ofte i åkeren, særleg når vi nyttar husdyrgjødsel til korn og arbeider jorda därleg. I haustkorn og andre åkergrøder på ompløgd voll, kan vi få mye höymole som spirer opp frå overlevande røter.

Krushöymole og byhöymole er i vårt land vanlege berre i kyststrøk i Sør-Noreg, men dei finst og i innlandet. Dei liknar vanleg höymole, men plantene er jant over mindre. Dei har eggforma utvikstrar (grynn) på blomsterblada. Byhöymola har dessutan blomsterblad med sylforma sidetenner.

Stengelblada hos höymole er tungeforma, med tverr eller rund grunn og litt bukta kant. Hos krushöymole er blada smalt avlange med bukta kant, medan blada hos byhöymole er breitt avlange, butte og flate med hjarteforma grunn. Toppen er høg, jambrei og tett hos höymole, høg, smal og

tett hos krushøyemole og stor, open med noko sprikjende toppgreiner utan blad hos byhøyemole.

Høyemoleartene set store mengder frø, ca. 9.000 pr. plante hos vanleg høyemole. Frøet er overlag seigliva, og over halvparten kan kome att med spireevna i behald sjølv om det blir føra opp. Det kan og liggje i jorda i mannsaldrar utan å misse spireevna. I eit amerikansk forsøk spirte frø av krushøyemole med 8% etter 70 års lagring i jorda og 2% etter 80 år.

Høyemolefrøet er vanskeleg å reinse frå timotei og blandfrø og blir rekna til dei "vondarta" frøa etter såvarelova.

Motarbeidning og tyning

Førebyggjande rådgjerder. Alt som tek sikte på å hindre frøspreiing, er særleg viktig. Høymo, oppsop frå krybber og førgangar og alt anna avlingsavfall som kan innehalde mye høyemolefrø, bør ein brenne, så det ikkje kjem over i gjödsla.

Tidleg slått og nedleggjing av graset i silo er effektiv rådgjerd til å hindre frøspreiing. Forsøk har vist at sjølv moden høyemolefrø vil bli heilt øydelagt ved å liggje i AIV-silo i 6-7 månader.

Skal graset tørkast til høy, vil høyemoleplanter slegne i blomstringsstadiet ettermodna frø på grunn av dei grove saftfulle stenglane. Er arbeidet overkomeleg, bør høymola plukkast ut or graset og köyrast bort frå kulturmarka og brennast eller gravast ned. Det same gjeld høyemole som er luka opp i god tid før slåtten.

Oppsliting av høyemoleplantene før blomstring, er ei gamal rådgjerd som framleis bør nyttast i frøeng, for å hindre at ein får høyemolefrø i engfrøet. Men ein blir som regel ikkje kvitt høymola ved berre luking. Det sit oftast att rotbitar i jorda som utviklar nye planter.

Kunsteng der høymola har teke overhand, er det best å pløya om og bruke til åker nokre år. Djup pløying med plog som velter godt, er viktig. Høymolerota lik r ikkje å bli snuudd opp ned. Røter som blir dregne opp med harva, bør samlast saman og köyrast bort. I poteter og rotvokstrar kan ein elles lett ta knekken på høymola ved vanleg god radreinsking.

Ved attlegg til eng gjeld det å få tak i reine såvarer og å gjødsle berre med kunstgjødsel.

Kjemiske middel. Der ein er plaga av höymole i kunstenga bør attleggsåkeren sprøyta med MCPA, 100 g pr. dekar, for å tyne planter som har spirt opp frå frø. Men sprøyta ikkje før klöveren har fått minst eitt trekopla blad. Mot eldre höymole i korn utan attlegg bør ein sprøyte med MCPP eller 2,4-DP i ei mengd av 200 g pr. dekar.

I stuttvarig kunsteng er det ikkje tilrådeleg å sprøyte, særleg av omsyn til klöveren. I timoteifrøeng kan det løna seg å sprøyte for å spare lukearbeid. Bruk i tilfelle 200 g MCPA eller 2,4-D salt pr. dekar.

I natureng, gamle vollar, kulturbeite og anna grasmark som ein ikkje kan eller vil pløye opp når höymola tek overhand, har vi fleire effektive kjemiske middel.

400 g MCPP eller 2,4-DP i 50 liter vatn pr. dekar under sterkeste veksten før blomstring har i våre forsøk tynt 95 prosent av höymolplantene og minska tørrvekta av höymola i höyet ned 97 prosent. Desse to midla verkar mykje betre og sikrare enn MCPA og 2,4-D. Ein kontroll av forsøksfelta året etter synte at höymolemengda var 90 prosent mindre i middel der det var sprøyta året før med MCPP eller 2,4-DP, enn der det ikkje var sprøyta.

Dicamba er eit nyare middel som er særleg effektivt mot höymole. I forsøka har 75 g dicamba pr. dekar hatt om lag like god, og 100 g pr. dekar betre verknad enn MCPP og 2,4-DP. 200 g MCPA pluss 50 g dicamba pr. dekar har jamt over verka vel så godt som MCPP eller 2,4-DP åleine.

Jamt over har 50 g dicamba i tillegg til full mengd MCPP eller 2,4-DP gjeve færrast overlevande planter, sjølv om utsлага for dicambatilsetting ikkje alltid har vore statistisk sikker eller økonomisk forsvarleg.

Ein ny forsøksserie tyder på at 400 g 2,4-DP pluss 25 g dicamba ofte er nok til å tyne bortimot 100 prosent av höymola, men ein må rekna med at det etter kvart vil spire nye planter frå frø i jorda. Ved val av sprøytemiddel må ein og ta omsyn til at det ofte finst andre ugras enn höymole som ein vil tyne samstundes. Mot engsoleie, krypsoleie og løvetann har dicamba åleine svært dårlig verknad. Mot desse artene tilrår vi MCPA som det beste og billegaste. Skal ein tyne höymole samstundes, må ein setje til 50 g dicamba pr. dekar. Elles ser dicamba ut til å vere svært effektiv mot matsyre, og etter amerikanske forsøk er det det beste middel mot småsyre.

Beste sprøytetida ser ut til å vere under den sterkaste veksten før blomstring - når höymola har store bladrosettar og blomsterstengelen tek til å skyta i været. I beite høver det ofte å sprøyte straks etter første arbeiting. Storfe og hest vrakar höymola som vanlegvis er på det rette sprøytestadiet på den tida.

Av omsyn til risikoen for usmak på mjølka, må mjølkekyr haldast borte 14 dagar etter sprøyting.

I slåtteng er det sikkert å sprøyta i god tid før første slått, når höymola har store bladrosettar og blomsterstengelen tek til å skyta i været. Men mange forsøk viser at ein kan få like god verknad ved å sprøyta etter slåtten når höymola har fått store bladrosettar i håa etter tidleg førsteslått. Sprøytinga er bortkasta når gjenveksten er liten. Utan vekst får ein ingen verknad av "hormonpreparata".

G R A S S T J E R N E B L O M (*Stellaria graminea*) Nellikfamilien

Fleirårig stadbunde ugras som formeirer og spreier seg med frø. Grasstjerneblom har i dei seinare åra spreidd seg sterkt, særleg på Sør-Austlandet og har vist seg svært brysam ved frøavl av di det er mest uråd å reinse desse frøa ut av timotei- og blandfrø. Statens frøkontroll har teke mot prøver av timoteifrø med over 30% av grasstjerneblom!

Motarbeiding

Godt reinhald i åkeren, reint såfrø og kunstgjødsel ved attlegget og sterkt gjødsling av enga er førebyggande rådgjerder. Sprøyting med MCPA har gitt bra resultat i timoteifrøeng.

L Ö V E T A N N (*Taraxacum officinale*) Korgplantefamilien

Fleirårig stadbunde ugras med pålerot. Lövetann set oftast frukt utan mjøling (apogami) og *T. officinale* er no delt opp i over 400 arter med ulike latinske namn. Men etter det vi no veit, speler artskilnadene lita rolle når det gjeld motarbeiding og tyning av lövetann.

Lövetann er svært vanleg overalt i landet vårt, frå havet til høgfjellet, og er rekna som det verste ugraset i eng, plenar, hagar, parkar, langs hekkar og gjerde, på grøftekanttar, vegkantar og jernbaneskråningar m.v. Finst og i beitemark, der lövetann er rekna for mindre skadeleg.

Årsaka til at dette ugraset er så utbreidd, er at det blomstrar og set frø på nokre få dagar, før graset tek til å vekse for alvor. Frøet spreier seg lett med vinden og spirer så snart det kjem ned i engbotnen, eller i open åker. Spirer best ved ca. 8% fullt dagslys etter svenske forsök. Avslegne blomstrar ettermodnar og lagar frø som spirer med ca. 50%.

Plantene blomstrar første gongen i 2. leveåret. I kunsteng er det difor mest i 3. og seinare engår at dette ugraset tek overhand. Lövetannplantene har ei opptil 50 cm lang sterkt greina fleirårig pålerot, som set nye skot frå det ytre cellelaget i rotmergen ved oppdeling. Oppstikking hjelper difor lite dersom ein ikkje får med heile rota.

Motarbeidning og tyning

Førebyggande rådgjerder har tidlegare vore det viktigaste: God engkul- tur i stuttvarige vollar. Påpasseleg slått, særleg av smittekjeldene langs veg- og grøftekantar. Lövetannfrøet blir øydelagt når graset blir lagt i silo med AIV-væske.

Med fenoksyeddiksyrane har vi fått effektive og praktisk brukande selektive kjemikal mot dette leie ugraset i alle slag grastmark der ein ikkje treng ta omsyn til klöveren. 2,4-D er litt meir effektivt enn MCPA. 2,4-D salt kan vi og bruke i jordbær og bringebær ved enkeltplantebehandling med "ugrasstav".

Bruk 2,4-D ester på veg- og grøftekantar dersom det ikkje finst "hormon-ømfintlige" kulturar i nærleiken. Esterforma fordampar på liknande måte som bensin. Fenoksypropionsyrer er mindre effektive enn fenoksyeddiksyrer.

d. Med uekte rot

E N G M O S E (*Hylocomium squarrosum*) Sporeplante

Fleirårig stadbunden skadeplante i naturleg eng, beite, gamle vollar og grasplenar. Engmose lagar eit tett moseteppe over grasrota og hemmar veksten hos dei nyttige engplantene og hindrar naturleg oppattning ved sjølvsåing, slik at plantesetnaden blir glisen og skral. Mosen er verst i rått verlag, på vassjuk eller kalktrengande, därleg gjødsla jord.

Motarbeiding og tynning

Mosen motarbeider vi med grøfting, kalking og sterk gjødsling, særleg med nitrogen, stuttvarig eng og djup vollpløying med skumskjær på plogen og grunnare pløying i åkeråra.

Engmose kan tynast med jernsulfat, 15-20 kg/da, strødd eller sprøyta ut på snau mark. Harving med moseharv eller raking med jernrive før behandlinga vil rive opp mosedekket og auke verknaden av kjemikaliet.

Det finst fleire "mosedreparar" på marknaden, alle med jernsulfat som det verksame emne, men dessutan er alle halvblanda med ammoniumsulfat som har til oppgåve å stimulere grasveksten og kvele mosen.

MINDRE VIKTIGE FLEIRÅRIGE STADBUNDNE UGRAS

a. Med trevlerot

SOLEIHOV (*Caltha palustris*) Soleiefamilien

ENGLODNEG RAS (*Holcus lanatus*) Grasfamilien

FINTTOPP (*Nardus stricta*) Grasfamilien

BALLBLOM (*Trollius europaeus*) Soleiefamilien

b. Med rotstokk

VANLEG MARIKÅPE (*Alchemilla spp.*) Rosefamilien

SLÖKE (*Angelica silvestris*) Skjermplantefamilien

VANLEG KNOPPURT (*Centaurea jacea*) Korgplantefamilien

SELSNEPE (*Cicuta virosa*) Skjermplantefamilien (Sjå side 80)

ORMETELG (*Dryopteris filix-mas*) Karsporeplante

AMERIKAMJÖLKE (*Epilobium adenocaulon*) Mjölkefamilien

ENGSTORKENEBB (*Geranium pratense*) Storkenebbfamilien

SJUSKJARE (*Geranium sylvaticum*) Storkenebbfamilien

ROME (*Narthecium ossifragum*) Liljefamilien

GULLRIS (*Solidago virgaurea*) Korgplantefamilien

c. Med pålerot

OKSETUNGE (*Anchusa officinalis*) Rubladfamilien
BOGEVINTERKARSE (*Barbarea arcuata*) Krossblomsterfamilien
RÖSSLYNG (*Calluna vulgaris*) Lyngfamilien
FAGERKNOPPURT (*Centaurea scabiosa*) Korgplantefamilien
SVALEURT (*Chelidonium majus*) Valmuefamilien
STOLT HENRIK (*Chenopodium bonus-henricus*) Meldefamilien
ASKERSTORKENEBB (*Geranium pyrenaicum*) Storkenebbfamilien
BJÖNNKJEKS (*Heracleum sibiricum*) Skjermplantefamilien
RAUDKNAPP (*Knautia arvensis*) Korgplantefamilien
VOLLKARSE (*Lepidium heterophyllum*) Krossblomsterfamilien
KVIT JONSOKBLOM (*Melandrium album*) Nellikfamilien
RAUD JONSOKBLOM (*Melandrium rubrum*) Nellikfamilien
GJELDKARVE (*Pimpinella saxifraga*) Skjermplantefamilien
ENGSMELLE (*Silene cucubalus*) Nellikfamilien
BLÅKNAPP (*Succisa pratensis*) Korgplantefamilien
VALURT (*Symphytum officinale*) Rubladfamilien
VÄRPENGEURT (*Thlaspi alpestre*) Krossblomsterfamilien

V. FLEIRÅRIGE VANDRANDE UGRAS (ROTUGRAS)

a. Med krypande, rotstående stenglar (tæger)

GÅSEMURE (*Potentilla anserina*) Rosefamilien

Gåsemure har krypande stenglar som sler røter fra leddknutane. Mange finna blad med kvasse tenner, silkehåra på undersida og stundom på oversida. Formeirer og spreier seg vegetativt og med frø. Planta finst spreidd i heile landet og kan bli brysam i eng, beite og åker, særleg på myr og vassjuk fastmark der tægene har lettast for å slå rot. Mot arbeidast ved grøfting, ompløyning og dyrking av radreinska vokstrar. Den kan tynast ved sprøyting med fenoksysyrer, særleg 2,4-D ester.

KRYSOLEIE (*Ranunculus repens*) Soleiefamilien

Fleirårig vandrande ugras som er vanleg i alle slag grøder over heile landet, men er avgjort verst i kyststrøk på våte stader og næringsrik jord. Kryssoleie spreier seg både med frø og vegetativt med rotstående stenglar, som kryp langs marka og lagar eit tettvakse plantedekke, med sterke evne til å hindre andre planter. Kryssoleia skil vi fra engsoleia på dei krypande stenglane og ved at midtre bladfliken er langskifta, medan den er sitjande hos engsoleia.

Motarbeiding og tyning

Kryssoleie kan ein motarbeide ved å hindre frøspreiing og ved grøfting. Planta kan tynast ved gjennomført reinhald i radkulturar. Den er lett å tyne med natriumklorat i åker. (10-15 kg/dekar om hausten).

Mot kryssoleie i grasmark er sprøyting med MCPA svært effektivt. 2,4-D og propionsyrer verkar og relativt godt. Kryssoleie er resistent mot amitrol, men kan tynast med diquat.

b. Med krypande jordstenglar

RYLLIK (*Achillea millefolium*) Korgplantefamilien

NYSERYLLIK (*Achillea ptarmica*) Korgplantefamilien

Fleirårige vandrande ugras som formeirer seg med frø og krypande jordstenglar. Ryllikartene er vanlege ugras i heile landet. Ryllik veks

særleg på tørre engbakkar og grasplenar. Nyserylllik liker seg best på tyngre eller noko rå jord og på myr. Finst både i kunsteng og åker. I beitemark finn ein rylikartene heilt opp på høgfjellet. Nyserylllik har spreidd seg i heile landet i nyare tid.

Motarbeidning

Ein bør hindre frøspreiing med såvarer og gjødsel.

Rylikartene, særleg vanleg rylik, er vanskelege å tyne med fenoksyssyrer. Best verknad får ein for MCPP, og tilsetjing av dicamba ser ut til å auka effekten. Men i eng bør ein sprøyta både før og etter første slått og i plenar 2-3 gonger med 3-4 vekers mellomrom.

S K V A L L E R K Å L (*Aegopodium podagraria*) Skjermplantefamilien

Fleirårig vandrande ugras som formeirer og spreier seg både med frø og vegetativt med krypande jordstenglar. Planta har dobbelt trekopla blad.

Skvallerkål er eit farleg ugras i planteskular, hagar og parkar. Den trivst best på moldrike jordarter og på skuggefulle stader, og finst mest på Austlandet til Sør-Fron og langs kysten til Svolvær. Utviklar store massar grundtliggjande jordstenglar som gjennomvev og filtrar i hop det øvre jordlaget.

Denne ugrasarten blir ofte spreidd frå stad til stad ved at jordstenglar følgjer med blandingsjord og kompost og med busker og tre som blir flytta med jordklump.

Skvallerkål spreier seg dessutan med frø frå planter som får stå i fred til modning langs hekkar og gjerde o.l. stader.

Motarbeidning og tyning

Ved motarbeidning av skvallerkål er det særleg viktig å unngå den passive spreininga av jordstenglar frå "urein" jord til "rein" jord. Ein kan svelte ut dei underjordiske organa ved stendig skyfling og hakking eller dekking med svart plast. Nyttar ein gamle papirsekker, må dei takleggjast i 3 lag. Dekke av plengras eller halm er ikkje effektivt nok.

Skvallerkål er resistent mot MCPA og 2,4-D, men kan tynast med 2,4,5-T i ei mengd av 500 g/dekar. Av natriumklorat må ein i tilfelle bruke minst 50 g/m². Amitrol i ei mengd av 1,5 kg pr. dekar har synt seg enda betre enn 2,4,5-T, og er ufarlegare for tre og busker.

K V E K E (*Elytrigia repens*, *Agropyron repens*) Grasfamilien

Fleirårig vandrande ugras som formeirer og spreier seg både med frø og med krypande jordstenglar.

Kveka er det mest brysame åkerugras i vårt land, særleg etter at ein tok til med einsidig korndyrking. Det veks elles i alle slag grøder og på alle slag jord, men er verst på lette, moldrike jordarter, der dei krypande jordstenglane har lettast for å spreie seg.

Den vegetative formeiringsevna er overlag stor. I 3. års eng fann Korsmo i eit tilfelle at råvekta av kvekejordstenglane utgjorde 2,9 tonn pr. dekar, med ei samla lengd bortimot 50 mil. Bylterud fann og 3 tonn pr. da rå kvekejordstenglar på ei myr der det var dyrka korn etter korn til den gjekk over til kvekeeng der matjorda var så gjennomvevd med jordstenglar at det viste seg uråd å pløye med vanleg plog. I eit sylinderforsök utfört av forfattaren var tørrvekta av dei underjordiske organa hos kveke som hadde fått rå grunnen åleine i 2 år, 4,3 tonn pr. dekar, og den samla lengd av jordstenglane tilsvara over 100 mil pr. dekar.

Jordstenglane er seige og ligg i matjordlaget ned til 15 cm djup. Adventivknoppane sit ved leddknutane. Vilkåret for at eit jordstengelstykke skal spire, er difor at det finst minst ein leddknote. Dei kan spire frå djupner ned til ikring 15 cm, men lite eller ikkje frå 20-25 cm (danske forsök). Jordstenglar som først er dregne fram på overflata med harv, skulle såleis kunne øydeleggjast ved djup nedpløyning. Derimot er dei svært vanskelege å tyne ved uttørking på overflata. I danske forsök måtte dei ligge i 6 dagar i varmt og tørt ver før dei vart øydelagde. Jordstenglar av hestehov og formeiringsrøter av åkerdylle miste spireevna etter berre 2 dagars uttørking.

Sigurd Håkansson (Sverige) har utført omfattande modellforsök med kveke. Han fann mellom anna at mengda av jordstenglar kunne fordoblast på ein månad om hausten, og 99% av dei nylaga jordstenglane låg i sjiktet 0-10 cm og ingen under 15 cm. Ved ulik djup nedgraving av jordstenglar av ulik lengde (4-32 cm) spirte alle lengder svært godt frå 2,5 og 5 cm, medan det frå 15 cm spirte berre 4% av knoppane på 8 og 32 cm lange utløparar og ingen frå dei som var 4 cm lange.

Kveka spreier seg ofte innover frå åkerreiner, grøftekantar og liknande smittekjelder. Frøformeringa spelar heller ikkje lita rolle. Frøet

modnar seint (august-september), men gror lett, sjølv like etter modninhaugen. Kveka er svært vanleg over heile landet til Nordland, sjeldnare lenger nord.

Motarbeiding og tyning

Kveke er lyselskande slik at det er ei viktig førebyggjande rådgjerd å dyrke vokstrar som dekkjer godt med stor evne til å skygge. I fleire omløpsforsøk har det vist seg at kveka tek mykje før overhand ved einsidig vårkveitedyrking enn ved dyrking av bygg eller havre.

Ved Institutt for jordkultur har dei eit langvarig jordarbeidingsforsøk på Kjerringjordet der det er brukt to ulike omløp: A = Potet - bygg - eng 3 år - havre, og B = Fôrbete - vårkveite - eng 3 år - vårkveite. Feltet var praktisk talt fritt for kveke ved starten, men i det 14. forsøksåret utgjorde kveka 5 vektprosent av loa ved den grunnaste pløyninga med berre ein gong harving om våren i omløp A mot 42% i det tilsvarende leddet i omløp B.

Den årlege arbeidninga av jorda spela elles ei stor rolle for kvekemengda. Ved å auka pløyedjupna om hausten frå 12 til 24 cm gjekk kvekemengda ned frå 42 til 28% av loa ved berre ei gong harving med fjörkultivator om våren. Ved i tillegg til fjörkultivator å harve ein gong med fjörharv og ein gong med ei tyngre rett-tindharv gjekk kvekemengda vidare ned til 13%.

Stubbarbeiding straks etter skuren, kan og redusera kvekemengda året etter monaleg. I middel for 25 danske forsøk (Permin) ga stubbharving med kultivator + 1-2 drag med lettharv 55% mindre kveke jamfört med vanleg haustpløyning i november-desember. (Stubbharving + djup haustpløyning).

Skumpløyning til ca. 10 cm djup + 1-2 drag med lettharv reduserte kvekemengda med 67%. (Skumpløyning + haustpløyning til vanleg djup).

Dyrking av poteter i to år på rad med gjennomført reinhald ved radreinsking, hakking og luking er effektivt, men svært arbeidskrevjende.

Av direkte tyningsmåtar elles har vi fleire å velje i mellom:

1. Heilbrakk, gjennomført som drillbrakk, er effektiv, men svært dyr då ein misser ei årsavling.

2. Haustbrakking med natriumklorat med dyrking av poteter eller kålrot året etter er og ein effektiv og sikker metode på stader med vilkår for utvasking av kloratet i vinterhalvåret. Landsomfattande forsök har vist at 50 kg/da tyner ca. 90% av kveka. Resten må vi tyne med radreinsking i ettergrøða.
3. Tidleg vårbehandling med TCA (2-2,5 kg/da) helst på telen straks snøen er gått, har og i landsomfattande forsök tynt i middel ca. 90% av kveka. Dette er ein billig og relativt sikker metode. Same året kan vi dyrke formargål, kålrot, nepe, raps, rybs, forbete, gulrot, kvitkål og visse potetsortar (Kerrs Pink, King George, Alpha, Prestkvern og Jøssing). Marius II og Saga toler minst TCA i jorda. Ås, Beate og Pimpernel er middels sterke.
4. TCA innarbeidd i jorda med fres eller rotorharv straks etter skuren og seinast i midten av september, har gitt svært god effekt på kveka i forsök på Sør-Austlandet i dei siste åra. Metoden har den store fordel at ein med visse atterhald kan dyrke havre eller toradsbygg året etter.
5. Sprøyting med amitrol mot kveke i havreåker, 100 g/da på 3-bladstadiet til havren, har i middel for 29 forsök redusert kvekemengda til 32% av usprøyta. Ved gjentatt sprøyting året etter gjekk kvekemengda ned til 16% i middel for 6 forsök. Det er viktig ved god jordkultur og gjødsling å få frodig vekst i havren, slik at skyggeverknaden kjem i tillegg til amitrol-verknaden.

K V I T B L A D T I S T E L (*Cirsium heterophyllum*) Korgplantefamilien
Fleirårig vandrande ugras som formeirer seg med frø og vegetativt med krypande jordstenglar. Kvitbladtistel veks på rålendte stader på moldrik jord over heile landet. Som ugras mest i naturleg eng og beite.

Motmiddel

Grøfting og sprøyting med fenoksysyrer.

Å K E R S N E L L E (*Equisetum arvense*) Snellefamilien

Fleirårig vandrande ugras som formeirer og spreier seg med sporer og krypande jordstenglar, som oftast djupt nede i undergrunnen.

Åkersnelle har to slag stenglar. Vårplanta er brungul med grove skjell-blad og utan greiner og med eit 2 cm langt sporeberande aks i toppen. Sporene spreier seg med vinden så snart dei modnar i mars-mai. Sommar-planta har grøne skot utan sporehus, men firkanta, kransstilte greiner. Det er eit leitt ugras i alle slag grøder, serleg på vassjuk, dårleg stelt jord, og på vegkantar, jernbaner, industriområde o.l.

Åkersnelle er ei ytterst dårleg førplante og skadeleg for dyra på grunn av mye kisel i celleveggane. Planta blir likevel ikkje rekna for ver-keleg giftig slik som t.d. myrsnelle. (Sjå side 82).

Motarbeiding og tyning

Åkersnelle kan ein motarbeide ved grøfting, god jordkultur og sterke gjødsling.

Haustbrakking med natriumklorat i ei mengd av 30-50 kg pr. dekar drep dei underjordiske organa. Sprøyting med MCPA drep dei ovajordiske or-gana, men ikkje rotssystemet. Amitrol derimot, har vist seg svært effek-tiv mot åkersnelle i våre forsøk i skogplanteskular.

S T O R M A U R E (*Galium mollugo*) Maurefamilien

Fleirårig vandrande ugras som formeirer seg med frø og vegetativt med stutte gruntliggende jordstenglar. Stormaure er eit brysamt ugras ved frøavl av timotei, og blir no rekna som "vondarta" etter såvarelova. Denne planta har spreidd seg sterkt på Austlandet i dei seinare åra.

Motarbeiding og tyning

Stormaure motarbeider vi best ved å hindre frøspreiing gjennom såvarer og husdyrgjødsel.

Planta er resistent mot fenoksyeddiksyrer, men kan tynast med fenoksy-propionsyrer, i alle fall MCPP.

T A K R Ö Y R (*Phragmites communis*) Grasfamilien

Fleirårig vandrande ugras som formeirer og spreier seg både med frø og vegetativt med lange, grove, innholne jordstenglar som gjerne ligg djupt i jorda.

Takrøyrr er vårt største gras og kan bli opp til 3 m høgt, med breie, flate blad og oppflisa slirehinne og stor, svartfiolett topp. Finst i heile landet, men mest på Austlandet, der den ofte er eit plagsamt ugras i opne grøfter og kanalar, og vandrar derifrå inn i tilgrensande åker og eng dersom grunnvatnet står for høgt.

Motarbeiding

Takrøyrr blir i kulturjord motarbeidd ved senking av grunnvasstandet og ved grøfting og god arbeiding av jorda. Sprøyting med dalapon har synt seg svært effektivt mot takrøyrr.

E I N S T A P E (*Pteridium aquilinum*) Bregnefamilien

Fleirårig vandrante ugras som formeirer seg med sporer og vegetativt med krypande jordstenglar. Einstape har lange, fingertjukke jordstenglar som ligg etter måten grunt og set spreidde lysskot. Brysamt ugras i nyrydda beiter og plantefelt i Sør-Noreg.

Motarbeiding og tynning

Einstape kan motarbeidast ved å så 2 gonger kvar sommar i 3-4 år på rad.

Vi har elles 3 herbicid som alle kan gi god verknad dersom vi sprøyter i rett tid: 4-CPA, amitrol og natriumklorat.

Ved bruk av fenoksyeddiksyra 4-CPA og amicrol, får vi best verknad ved sprøyting med ryggtåkesprøyte straks blada er fullt utsprungne. For natriumklorat (15-20 kg/da) ved sprøyting med vanleg sprøyte i juli-august.

H E S T E H O V (*Tussilago farfara*) Korgplantefamilien

Fleirårig vandrante ugras, som spreier seg med lange jordstenglar, men i motsetnad til kveke har hestehov mye jordstenglar ned i undergrunnen og, ofte i fleire sjikt under einannan.

I åkeren er det mest berre på denne måten den spreier seg. Blomstring og frøsetting går for seg tidleg om våren - før våronna. Frøet har fnokk og spreier seg lett med vinden. Frø som fell på rå jord gror svært snøgt, men frøplantene veks seint og går vanleg til grunne under vårarbeidet i åkeren. Det er berre dei plantene som får vekse i fred sommaren over

på grøfte- og vegkantar som rekk å lage jordstenglar første året. Hestehov "vandrar" difor mest alltid inn i åkeren frå utkantane. Da jordstenglane er svært skøyre, vil dei og dele seg opp og bli spreidd passivt ved jordarbeidninga, og bitar som det finst leddknutar på kan spire og lage nye planter. Etter danske forsök kan dei spire frå djupner ned til 35 cm.

Hestehov er eit vanleg rotugras, serleg i leirjordstraktene, sjeldnare i kyststrøka. Planta veks både i åker og grasmark.

Motarbeidning og tynning

Der ein har poteter eller andre radreinska vokstrar kan ein tyne hestehov mekanisk. Der ein driv einsidig korndyrking, kan det bli nødvendig å heilbrakke, eller haustbrakke med natriumklorat der nedbören er stor nok. 25-30 kg pr. dekar vil tyne over 90% av ugraset. Dette middel bør ein særleg nytte på hestehovflekker i åkrane, og til å sterilisere smittekjeldene i utkanten av åkeren. Da bør ein ha på 40-50 kg pr. dekar for å vere viss på å tyne 100%.

Hestehov er vanskeleg å tyne med andre herbicid. Forsök er i gang, og det som har synt seg mest lovande i kornåker hittil, er sprøyting med MCPP eller 2,4-DP to gonger med ca. 3 vekers mellomrom. Tilsetjing av dicamba har auka effekten litt.

Sprøyting med amitrol (500 g/da) på fullt utsprungne blad om våren, 4-5 dagar før såing av havre, eller i stubbåkeren om hausten, seinast 3-4 veker før haustpløying, er og metodar som fortener å bli meir prøvd.

S T O R N E S L E (Urtica dioica) Neslefamilien

Fleirårig vandrande ugras som formeirer seg med frø og vegetativt med krypande jordstenglar.

Stornesle er ei svært vanleg plante i heile landet, på god jord både i utmark og innmark. Som ugras mest flekkvis i beite og kring uthus, stolpar, steinrøyser og langs gjerde, hekkar o.l.

Motarbeidning og tynning

Stornesle er lett å tyne med 2,4,5-T ester. 150 g verksamt emne er nok når ein sprøyter under den sterkeste veksten før blomstring. MCPA og 2,4-D drep og dei grøne plantedelane, men ikkje rotsystemet.

Stornesle toler lite natriumklorat. (20-30 kg pr. dekar). Den kan og tynast med amitrol.

c. Med krypande formeiringsrøter

G E I T E R A M S (*Chamaenerion augustifolium*) Mjølkefamilien

Fleirårig vandrande ugras som formeirer seg med frø og vegetativt med krypande formeiringsrøter. Geiterams er ei typisk lettjordsplante og kan vere eit overlag brysamt ugras på sand- og myrjord i alle slag grøder, særleg i heile Glommadalføret, men er dessutan vanleg på udyrka mark i heile landet, og blir rekna som merkeplante på nitratrik jord. Frøa er svært små og forsynt med ein lang hårdusk så dei spreier seg vidt ikring med vinden. Geiterams har også sterkt vegetativ spreieingsevne med lange, grove, krypande formeiringsrøter. Som ofta ligg dei under plognålet. Den underjordiske delen av stengelen lever i mange år og set nye stengelskot frå adventivknoppar.

Geiterams kan tynast ved sprøyting med amitrol før blomstring. Fenoksyeddiksyrer, særleg esterforma, drep og dei grøne plantedelane, men ikkje alt av rotssystemet.

Å K E R T I S T E L (*Cirsium arvense*) Korgplantefamilien

Fleirårig vandrande ugras som spreier seg med frø og vegetativt med krypande formeiringsrøter.

Åkertistel veks både på dyrka og udyrka mark, på alle slag jord, unntake tørr sandjord og myrjord, og er av dei mest brysame ugras i alle slag grøder over storparten av kloden. Så nær som i Troms og Finnmark og delvis på Vestlandet, er åkertistelen velkjend overalt i vårt land. Korsmo rekna dette ugraset for det verste vi hadde.

Åkertistelen spreier seg både med frø og eit vidt forgreina system av horisontale formeiringsrøter, som ofte ligg sjiktvis nedover i undergrunnen. Dessutan er det vertikale røter som kan gå eit par meter djupt. Alle desse røtene er vel forsynte med adventivknoppar. Frøplanta tek til å utvikle formeiringsrøter alt i spøringsåret, og blomstrar og set frø første gongen året etter. Men da det er særskilde han- og hoplanter (særbu = tvibu), blir det ikkje frø på alle. I tistelkoloniar utvikla på vegetativ veg, kan det såleis hende at ein finn berre hanplanter.

Da frøet har fnokk, spreier det seg lett med vinden, men nymodna frø ser ikkje ut til å gro særleg lett. (Danske og svenske forsök). Frø som har overvintra gror derimot godt, især når det har overvintra i jord. Agner og höymo er ofte rike på tistelfrø som har lett for å kome over i gjödsla. Dessutan finn ein ofte "tistelknopp", d.v.s. blomsterhovud med eller utan frø, i därleg reinsa såkorn.

Motarbeiding og tyning

Ein motarbeider åkertistelen ved å hindre frøspreiing på alle måtar, og ved dyrking av radreinska vokstrar med godt reinhald.

I jordbruket er åkertistel relativt lett å tyne ved sprøyting med MCPA eller andre fenoksysterer i korn og grasmark. Men vi må venta til dei fleste skota er komme opp og har laga store bladrosettar med 15-25 cm høge blomsterstenglar hos dei eldste skota. På gardar der ein har sprøyta årleg med slike middel i seinare år, har åkertistelen kome heilt bort. Dinoseb og visse andre kontaktgifter svir ned unge bladrosettar av dette ugraset, men skader ikkje rotssystemet.

Andre effektive tyningsmåtar er drillbrakk med djuparbeiding og haustbrakking med natriumklorat. 20-30 kg/da drep 90-95% av åkertistelen.

Tistelfrøet blir øydelagt i AIV-silo, men ikkje ved luting av halm. Spireprosenten aukar etter lutinga.

Å K E R V I N D E L (*Convolvulus arvensis*) Vindelfamilien

Fleirårig vandrande ugras som formeirer seg med frø og vegetativt ved eit svært djuptgåande fleirårig rotssystem, som kvar vår sender opp lys-skot, og kan greine seg sterkt utover med fleire sett gaffelgreiningar under jordoverflata. Stengelen er krypande og vind seg kring andre planter.

Åkervindel er eit av dei verste ugrasa i mange störlegare land. Hos oss meir lokalt i dei lågare stroka av Austlandet, og ved kysten til Buvik, mest som hageugras, men og i åker og eng, på vegkantar og langs gjerde o.l.

Åkervindel liknar sterkt på strandvindel (*Calystegia sepium*). Båe har pilforma blad og ofta kvite trompetforma blomstrar, men blada hos åkervindelen har ein brei opning mot bladskiftet medan strandvindel har eit djupt trøngt skar. Åkervindelen har dessutan to små høgblad midt på

bladskuftet som strandvindelet mangler. Denne har og dei største blomstrane.

Motarbeiding og tynning

Åkervindel er vanskeleg å rydde ut der den har fått innpass. Ved stendig skyfling, hakking og anna mekanisk reinhold slik at ein hindrar assimilering, vil ein etter kvart svelta ut rotssystemet så det går til grunne.

I kornåker og grasmark kan sprøyting med MCPA eller 2,4-D før blomstring gjere god verknad. Men som regel må vi sprøyte i fleir år på rad for å tyne alt.

På mindre bol, særleg på uproduktiv mark, kan vi og nytte natriumklorat i mengder på minst 50 g pr. m^2 .

V E G K A R S E (*Rorippa silvestris*) Krossblomsterfamilien

Fleirårig vandrande ugras som formeirer seg med frø og vegetativt med krypande formeiringsrøter og krypande rotstående stenglar ("krypkarse").

Planta har gul blomster og skulpa er 1 mm brei og 8-10 mm lang. Blada er finna utan Øyreflikar ved grunnen i motsetnad til brunnkarse (*R. islandica*) som den elles liknar.

Vegkarse har spreidd seg i dei seinare åra, særleg i planteskular, hagar og parkar, m.a. med den jorda som følgjer med stauder og busker.

Vegkarse formeirer seg overlag snøgt både med frø (omkr. 13.000 pr. plante) og vegetativt. Rotssystemet er ein kombinasjon av sterkt greina pålerøter og formeiringsrøter som gjennomvev matjordlaget på kryss og tvers. Røtene er tett sette med adventivknoppar som set lysskot med stutte mellomrom. Dessutan breier planta seg i tette bol med dei krypande rotstående stenglane og har ei utruleg evne til å kvele kulturplantene.

Motarbeiding og tynning

Mötarbeidast ved å hindre spreiling av frø og især vegetative formeiringsorgan som har lett for å følgja med busker, tre og stauder som blir selde med jordklump.

Dette farlege ugraset må utryddast fullstendig overalt der det syner seg. Ein kan tyne det med 40-50 kg natriumklorat pr. dekar, og ved sprøyting med fenoksysyrer.

S M Å S Y R E (*Rumex acetosella*) Syrefamilien

Fleirårig vandrande ugras som formeirer og spreier seg med frø og vegetativt med krypande formeiringsrøter.

Småsyre er eit vanleg ugras i heile landet, især på lettare jord (grus, sand og myr). Ein kan finne det i alle slag grøder, men det er særleg som engugras på skrinn, kalkfattig jord den gjer seg mest gjeldande.

Rotsystemet er ei blanding av grove, knutrete hovudrøter og formeiringsrøter som veks i siksak opp og ned i matjordlaget, og er tett sette med formeiringsknoppar.

Frøspreiinga spelar likevel større rolle. Dei små trekanta frøa er nok så vanskelege å reinse ut av frø av timotei, kvitkløver, alsikekløver og især blandfrø. I höymo kan det sjølvsagt bli svært mykje frø av dette ugraset.

Frøet er svært seigliva og kan t.d. gå gjennom dyremagen utan å misse stort av spireevna. Spireprosenten ~~aukar etter~~ luting og oppforing. I prøver av husdyrgjødsel og kulturjord fra ulike kantar av landet, var frø av småsyre heilt dominerande mellom dei fleirårlige ugrasartene. (Korsmo). Frøet kan ligge i jorda i mannsaldrar utan å misse spireevna.

Motarbeidning og tyning

Småsyre blir motarbeidd ved kalking og sterkt gjødsling, og ved å bruke reint såfrø og kunstgjødsel ved attlegget. Særleg må ein unngå å avle frø på eng der det er småsyre. Elles kan ein bruke dei same rådgjerdene som for andre rotugras.

Sprøyting med fenoksyeddiksyrer drep berre dei ovanjordiske plantedelane. Fenoksypropionsyrer og dicamba har derimot betre og varigare verknad.

Å K E R D Y L L E (*Sonchus arvensis*) Korgplantefamilien

Fleirårig vandrande ugras som formeirer og spreier seg med frø og vegetativt med krypande formeiringsrøter.

Åkerdylle liknar åkertistel både i utviklingsgang og veksemåte. Men formeiringsrøtene ligg her svært grunt (2-10 cm). Dei er svært skøyre, og blir difor sterkt oppdelte av plog, harv og især jordfresar. Då dei

dessutan er svært tett sett med adventivknoppar, slik at stubbar ned til 0,5 cm kan lage nye planter, vil den vegetative formeiringa hos dette ugraset spele ei stor rolle. Formeiringsrøtene ser ikke ut til å kunne spire når dei ligg djupare enn 10-15 cm (danske forsök). Både over- og underjordiske organ har kvit mjølkesaft, og er såleis lette å skilje fra åkertistel, som planta liknar i blomsterlaus tilstand. Åkerdylle har elles tunnare og mjukare blad og mjukare tornar enn åkertistelen. Den skil seg fra dei eittårige dylleartene på rotssystemet, og ved å ha gule kjertelhår på blomsterskaft og korgdekkblad.

Åkerdylle er eit vanleg åkerugras både i kyststrøk og innlandsstrøk, særleg på tyngre og gode, kalkrike jordarter. Den veks og på god, dyrka myr, men aldri på udyrka myr. Åkerdylle finst og ofte i kunsteng og i hagar.

Motarbeidning og tyning

Rådgjerdene er dei same som for åkertistel, men åkerdylle er eit av dei ugrasa som toler mest natriumklorat. Åkerdylle er heller ikke så lett å tyne med fenoksyssyrer som åkertistel, men sprøyting med MCPA når dei første blomsterknoppene tek til å syne seg, kan gi fullgodt resultat. Blada er glatte og sterkt vokslagte og vanskelege å væte utan vætemiddel i sprøytevæska. MCPP og 2,4-DP verkar noko betre enn MCPA, men MCPA + dinoseb og fenoksypropionsyrer + joksynil har verka best i forsøka.

d. Med stengelknollar i jorda

Å K E R M Y N T E (*Mentha arvensis*) Lepeblomsterfamilien

Fleirårig vandrande ugras som formeirer seg med frø og vegetativt med stengelknollar i jorda. Åkermynnte har ofta ugreina stengel, motsette, småtagga lodne blad og raudfiolette blomstrar i skilde kransar oppetter stengelen. Planta har sterkt krydderlukt.

Åkermynnte liker endå råare jord enn åkersvinerot, men veks helst på jord med leirkarakter og sur reaksjon. Elles har åkermynnte den same vekse- og formeiringsmåte som åkersvinerot, men knollane er mindre og greina. Dei er dessutan meir jantjukke, utan innsnöringar. Finst spreidd som ugras i åker og eng over heile landet til N. Trøndelag.

Motarbeidning ved grøfting, kalking og god jordkultur. Åkermynte kan tynast ved haustbrakking med natriumklorat. Selektive bladherbicid har liten verknad.

VÅRKÅL (*Ranunculus ficaria*) Soleiefamilien

Fleirårig vandrande ugras som formeirer seg vegetativt både med stengelknollar i jorda og laukknoppar i bladhjørna. Vårkål veks berre på våt, næringsrik jord på Austlandet og i kyststrøk. Mest i parkar og i småskog.

Motarbeidning skjer best ved grøfting. Den skal elles kunna tynast ved sprøyting med MCPA.

ÅKERSVINEROT (*Stachys palustris*) Lepeblomsterfamilien

Fleirårig vandrande ugras som formeirer og spreier seg med frø og vegetativt med stengelknollar i jorda. Firkanta stiv stengel med mange motsette, silkehåra blad med mange runde tenner. Lysraude blomstrar i tettstilte kransar i toppen.

Åkersvinerot utviklar nede i matjordlaget 10-50 stengelknollar pr. plante. Knollane er lange og ujamne med leddforma innsnöringar. Dei er skøyre og blir lett avbrotne under jordarbeidninga. Nye skot utviklar seg da frå adventivknoppar (grouage) som sit parvis ved kvart ledd på knollen. Heile knollar gror berre frå spissen. Når plantene utviklar seg frå frø, lagar dei første året knollar på den merkelege måten at dei nedste greinpara veks nedover i jorda og blir omlaga til knollar.

Frøet har hardt, feittrikt skal og kan ligge i jorda i mange år før det gror.

Motarbeidning og tynning

Åkersvinerot kan ein motarbeide ved grøfting og elles som åkertistel, og går for dei same kloratmengdene, men er meir motstandsfor mot fenoksysyrer. MCPA har ikkje tilfredsstillande verknad. MCPP ser ut til å verka noko betre ved sprøyting etter at dei fleste skota er komme opp.

e. Med vegetativ formeiring på ymse andre måtar.

T Y R I H J E L M (*Aconitum septentrionale*) Soleiefamilien

Fleirårig vandrande ugras som formeirer seg med frø og vegetativt på liknande måte som mjødurt. Giftig plante, vanleg over heile landet, særleg i skoglier og steinet mark med rå jord i litt større høgd over havet. Brysamt ugras i nyrydda kulturbeite. Planta er meterhøg med store handflika blad og gråblå opprette blomstrer i lang klase. Blomsteren har høg poseforma hjelm - derav namnet. (Sjå elles side 80).

Motarbeiding og tyning

Avhogging eller oppryskjing av plantene 2 gonger kvar sommar dei 2 første åra og ein gong seinare vil hjelpe noko. Men det sikraste midlet på jord som ikkje kan pløyast er natriumklorat ($40-50 \text{ g/m}^2$) eller sprøyting med fenoksyeddiksyrer.

H U N D E K J E K S (*Anthriscus silvestris*) Skjermplantefamilien

Fleirårig vandrande ugras som formeirer seg både med frø og vegetativt. Hundekjeks veks i koloniar fordi pålerota utviklar ein krans av nye planter frå formeiringsknoppar i røthalsen. Etter frøsetjinga dør primærrota bort, og siderøtene blir frie og lagar sjølvstendige planter. Hundekjeks set elles svært mykje frø (ikring 10.000 pr. plante), men frøet spirer seint. Frøplanta utviklar berre ein bladrosett og ei inntil 30 cm lang pålerot i spiringsåret. Den vegetative formeiringa tek til i 2. året, men blomstring og frøsetjing først i 3. året. Dei 2-årige dotterplantene har da sett nye "avleggjarar", og utviklinga held vidare fram på same måten. Svært vanleg ugras i gamal kunsteng og naturleg grasmark over heile landet, men nest vesta- og nordafjells. Liker rå, moldrik og næringsrik jord. Brysamt ugras i frukthagar og langs hekkar, gjerde, grøfter og vegar. Trivst og svært godt kring gjødseldynger.

Motarbeiding og tyning

Motarbeiding ved å hindra frøspreiing. Hundekjeks kan tynast ved å skyfe røtene av ca. 5 cm under jordoverflata, og ved pløyning og bruk av jorda til åker nokre år. Hundekjeks er resistent mot fenoksyeddiksyrer, men store mengder fenoksypropionsyrer har gitt lovande resultat. Hundekjeks toler elles lite natriumklorat. 15-20 kg/da, sprøyta på tidleg

om våren eller straks etter slåtten, tyner minst 90%, medan dei fleste grasarter vil overleve. Kloratsprøyting mot hundekjeks må som regel kombinerast med MCPA-sprøyting før første slått for å tyne løvetann, soleier og matsyre som ikkje går for denne kloratmengda og vil innta plassen etter tynt hundekjeks. Det kan og bli nødvendig med isåing av grasfrø våren etter kloratbehandlinga.

UGRASKLOKKE (*Campanula rapunculoides*) Klokkefamilien

Fleirårig vandrande ugras som formeirer seg både med frø, og vegetativt med stutte jordstenglar som utviklar seg frå hovudet av dei tappforma pålerötene, som Korsmo kalla "ammerötter". Toppen av ammerötene med jordstenglane ligg ca. 5 cm under jordoverflata. Kvar rot set eitt eller eit par lysskot, men det er berre få av desse som lagar blomsterstenglar, og da som regel først 3. året etter spiring frå frø. Ugrasklokke har fiolette klokkeblomstrar i lang klase i toppen av stengelen. Dei nedre blada er langskaftha, hjarteforma og lodne.

Finst mest på Austlandet nord til Sør-Fron og utmed kysten til Hordaland.

Ugrasklokke er eit farleg ugras, særleg i hagar, parkar og planteskular der det blir spreidd mekanisk på liknande måte som vegkarse og skvallerkål, og det er vanskeleg å kome til livs innimellom busker og tre.

Motarbeiding og tynning

Motarbeiding ved å hindre spreiling av frø og især dei vegetative formeiringsorgana. Ved skyfling og hakking gjeld det å få skore av hovudet på ammerötene. Ved omspaing og pløying bør ein plukke bort rötene. Ugrasklokke er resistent mot dei aller fleste herbicid. Dei mest lovande resultata hittil har vi fått ved sprøyting med amitrol.

MJÖDURT (*Filipendula ulmaria*) Rosefamilien

Fleirårig vandrande ugras som spreier seg med frø og vegetativt ved eit tett nett av sterkt greina fingertjukke jordstenglar like under jordoverflata. Mjödurt veks difor i store samanhangande bol som dekkjer marka heilt. Frøproduksjonen er svært stor (over 30.000 frø pr. plante). Det er ei vanleg plante i heile landet, særleg på våte stader og moldrik jord. Som ugras mest i beitemark, natureng og langs opne grøfter.

Motarbeidning og tynning

Motarbeidning med grøfting. Mjødurt er lett å tyne både med fenoksyeddiksyrer og amitrol.

K N A P P S E V (*Juncus conglomeratus*) Sevfamilien

L Y S S E V (*Juncus effusus*) Sevfamilien

Fleirårige ugras som formeirer seg med frø og vegetativt med stutte, sterkt greina jordstenglar som lager tette tuver av lysskot. Lyssev og knappsev kan vere brysame ugras i sidlendt beite og i opne grøfter.

Motarbeidning skjer på same måte som mot sølvbunke (5-15 g natriumklorat pr. tuve). Mange forsøk i England og Tyskland syner elles at i alle fall lyssev kan tynast ved sprøyting med MCPA og 2,4-D under den sterkeste veksten før blomstring. Slått 2-4 veker etter sprøytinga skal øke verknaden.

M A T S Y R E (*Rumex acetosa*) Syrefamilien

Fleirårig ugras som formeirer seg mest berre med frø, men også vegetativt ved at øvre delen av pålerota kløyver seg opp og kvar del utviklar nye planter med nye pålerøter o.s.v. Denne formeiringsmåten spelar lita rolle, og i praksis kan planta reknast for stadbunden. Matsyre produserer mykje frø av om lag same storleik som alsikekløver. Mykje av det største alsikefrøet følgjer med ved reinsinga. Frøet spirer godt både haust og vår. Men vårspira planter blomstrar første gongen året etter.

Matsyre er eit vanleg ugras i naturleg eng og gamle vollar over heile landet, men især på Sør- og Vestlandet, der dette ugraset ofte er den dominante planta i enga.

Motarbeidning og tynning

Motarbeidning ved at frøspreiinga blir hindra og ved god jord- og engkulatur.

Fenoksyeddiksyrer verkar godt og fenoksypropionsyrer svært godt mot matsyre. Dicamba er også svært effektiv.

MINDRE VIKTIGE FLEIRÅRIGE VANDRANDE UGRAS

a. Med krypande rotstående stenglar

K R Y P K V E I N (*Agrostis stolonifera*) Grasfamilien
T U S E N F R Y D (*Bellis perennis*) Korgplantefamilien
K R O S S K N A P P (*Glechoma hederacea*) Lepeblomsterfamilien
T U N A R V E (*Sagina procumbens*) Nellikfamilien
T V I S K J E G G V E R O N I K A (*Veronica chamaedrys*) Maskeblomsterfamilien
L E K J E V E R O N I K A (*Veronica officinalis*) Maskeblomsterfamilien
S N A U V E R O N I K A (*Veronica serpylifolia*) Maskeblomsterfamilien

b. Med krypande jordstenglar

S T O R K V E I N (*Agrostis gigantea*) Grasfamilien
K V I T S Y M R E (*Anemone nemorosa*) Soleiefamilien
B L A D F A K S (*Bromus inermis*) Grasfamilien
S T O R A R V E (*Cerastium arvense*) Nellikfamilien
R E I N F A N N (*Chrysanthemum vulgare*) Korgplantefamilien
S T R A N D V I N D E L (*Calystegia sepium*) Vindelfamilien
M Y R S N E L L E (*Equisetum palustre*) Snellefamilien (Sjå side 82)
S K O G S N E L L E (*Equisetum silvaticum*) Snellefamilien
K V I T M A U R E (*Galium boreale*) Maurefamilien
G U L M A U R E (*Galium verum*) Maurefamilien
E N G H U M L E B L O M (*Geum rivale*) Rosefamilien
D A U V N E S S L E (*Lamium album*) Lepeblomsterfamilien
H A N E K A M (*Lychnis flos-cuculi*) Nellikfamilien
L E K J E P E S T R O T (*Petasites hybridus*) Korgplantefamilien
S T R A N D R Ö Y R (*Phalaris arundinacea*) Grasfamilien
E N G R A P P (*Poa pratensis*) Grasfamilien
V A S S-S L I R E K N E (*Polygonum amphibium*) Syrefamilien
O R M R O T (*Polygonum bistorta*) Syrefamilien
S K O G S E V A K S (*Scirpus silvaticus*) Storrfamilien
B L Å B Å R (*Vaccinium myrtillus*) Lyngfamilien
B L O K K E B Å R (*Vaccinium uliginosum*) Lyngfamilien

c. Med krypande formeiringsrøter

S Y P R E S S V O R T E M J Ö L K (*Euphorbia cyparissias*) Vortemjölkfamilien

T O R S K E M U N N (*Linaria vulgaris*) Maskeblomsterfamilien

K U L E K A R S E (*Rorippa austriaca*) Krossblomsterfamilien

d. Med stengelknollar i jorda

e. Med vegetativ formeiring på ymse andre måtar

V I L L L A U K (*Allium oleraceum*) Liljefamilien

S I B I R G R A S L A U K (*Allium sibiricum*) Liljefamilien

S T R A N D L A U K (*Allium vineale*) Liljefamilien

R A M S L A U K (*Allium ursinum*) Liljefamilien

B L Å K L O K K E (*Campanula rotundifolia*) Klokkefamilien

T J E R E B L O M (*Viscaria vulgaris*) Nellikfamilien

TEINUNG

(Tennung) eller renning (rynning) kallar ein dei stubbeskota og rotstokta lauvtreslaga set når dei blir avhogne. Or og bjørk t.d. set mest berre stubbeskot, medan osp t.d. set mest berre rotskot. Teinungen kan vere overlag brysam ved rydding av beite i skog utan stubbebryting. Dei vanlegaste teinungslaga kan ein nå lettvint tyne ved sprøyting med fenoksyeddiksyre ester på bladverket om sommaren, frå blada er fullt utvikla til midten av august.

Bruk ryggtåkesprøyte ved lauvsprøyting av busker og kratt. Bruk 2,4,5-T ester mot bjørk, or, vier, selje, hassel, rogn og hegg. (100 g verksamt emne i 12 liter vatn pr. dekar).

Bruk amitrol mot ask, eik, alm, bøk, lønn og hyll (300 g verksamt emne i 10 liter vatn pr. dekar) når lauvet er fullt utsprunge om våren.

Bruk hoggspøyting med amitrol mot osp (20% oppløysing og 1 hogg pr. 5 cm diameter) med ei spesiell øks som automatisk injiserer sprøytevæska inn i såret for kvart hogg.

GIFTIGE UGRAS

(Vekseplassar og utbreiing etter Johannes Lid: Norsk og svensk FLORA)

T Y R I H J E L M (*Aconitum septentrionale*) Soleiefamilien

Giftemne og verknad: Særleg rota er rik på alkaloidet aconitin som verkar sentralt lammande på andingssentret, og perifert på dei motoriske nerveendane - også i hjarta som blir lamma og stoggar til slutt. Aconitin er ei gamal pilegift. (Sjå elles side 74).

Vekseplassar og utbreiing: I skog og fjell. Austlandet sør til Trøgstad, Gjerpen og Bykle. Indre Vestlandet. Trøndelag og Nordland. Skåland. Skjervøy. Jotunheimen til 1.600 m.o.h.

H U N D E P E R S I L L E (*Aethusa cynapium*) Skjermplantefamilien

Giftemne og verknad: Inneheld alkaloidet cynapine og små mengder av eit coniin-liknande alkaloid som verkar lammande på andingssentret i sentralnervesystemet.

Vekseplassar og utbreiing: I hagar og på avfallslassar. Sør-Noreg til Trondheim. Mosjøen, Ibestad. Tromsø.

K L I N T E (*Agrostemma githago*) Nellikfamilien

Giftemne og verknad: Agrostemin eller githagin som set bitter smak på mjøl og verkar narkotisk.

Vekseplassar og utbreiing: Åkerugras og på avfallslassar. Ikkje lengre vanleg i Noreg, men finst nord til Finnmark.

S E L S N E P E (*Cicuta virosa*) Skjermplantefamilien

Giftemne og verknad: Cicutoxin, eit alkaloid med sterk narkotisk verknad. Symtoma på forgiftning er stiv tunge, sterk spytsekresjon, kramper og død etter 1-3 timer. Heile planta er giftig, men rotstokken er mest giftig. Eit stykke så stort som ein halv veslefinger er livsfarleg. Helsedirektoratet har gitt ut eit småskrift med tittelen: "SELS-NEPA er den farligste GIFTPLANTEN som gror i Norge".

Vekseplassar og utbreiing: Ved kjønner og stille bekker. Austlandet frå Arendal til Øvre Rendal og Sel. Spind. Lista. Soknedal. Kvinderhad til Lindås. Solund. Trondheim til Sparbu. Snåsa. Kolvereid. Kautokeino.

Kjennemerke: Selsnepa vinner om sløke og hundekjeks, men har 2-3 ganger delte blad med avlange sagtakka flikar. Skjermene har småsveip, men manglar storsveip, og frukta er kulerund. Det sikkreste kjennemerket er elles den tjukke gulrotliknande rotstokken som er innhol og delt i fleire rom med horisontale tverrveggar. Ingen andre norske planter skal ha eit slikt "giftskap" i rota. Ved gjennomskjering piplar det fram ei gulkvit giftig mjølkesaft.

Tyning: Denne farlege giftplanta, som likar næringsrikt vatn, og difor ofte finst i nærleiken av tettbygde strok, bør utryddast ved oppstikking av rotstokken eller helst ved sprøyting med 2,4-D ester, 2,4,5-T ester eller blanding av desse. Sprøyting med desse midla under den sterkeste veksten før blomstring har synt seg svært effektivt i våre forsøk. Amitrol var derimot mindre effektiv. Med ryggtåkesprøyte skulle ein kunne nå dei fleste plantene frå landsida eller frå båt. Den veks oftest på hengjemyrar og dels heilt ute i vatnet slik at den er vanskeleg å nå på annan måte.

G I F T K J E K S (*Conium maculatum*) Skjermplantefamilien

Giftemne og verknad: Alkaloidet coniin som verkar lammande på andingssentret i sentralnervesystemet (Sokrates). Coniin var det første alkaloidet som blei framstilt syntetisk (Ladenburg 1886).

Vekseplassar og utbreiing: I åkrar, ved vegar og på avfallslassar. Norderhov og einskilde stader utmed kysten frå Oslo til Trondheim.

Kjennemerke: Raudflekka stengel. Blad som hjå hundekjeks, men mørkegrøne. Mangeblada storsveip og fåblada småsveip. Snau eggrund frukt, 3-4 mm lang med ujamne, bukta ribber.

P I G G E P L E (*Datura stramonium*) Søtvierfamilien

Giftemne og verknad: Alkaloida hyoscyamin, atropin og skopolamin som lammar parasympaticus. Slappar glatt muskulatur og stoggar kjertelsekreasjon. Bedøver visse senter i sentralnervesystemet. Pupilleutviding. Symptoma er delerier og halusinasjonar. Slappar så av, somnar og dør.

Vekseplassar og utbreiing: Medisin- og hageplante. Inntil 1946 sjeldsynt i vårt land, men heilt nord til Måsøy i Finnmark. Sidan nokså vanleg som ugras, Austlandet nord til Ringebu, elles i kyst- og fjordbyg-

der nord til Sparbu i Nord-Trøndelag. (Den kom ut i åkrane med husdyrgjødsel etter føring med kraftfør importert fra Amerika).

Kjennemerke: Eittårig om lag snau plante med gaffeldelt stengel, store blad med få grove tenner. Einskilde blomstrar i bladhjørna. Krukkeforma beger og lang røyrfoma, kvit eller blå krone. Rund tettpigga kapsel av form som eit lite eple.

V I L L R O T (*Hyoscyamus niger*) Søtvierfamilien

Gifterne og verknad: Dei same som hjå piggeple.

Vekseplassar og utbreiing: Vegkantar, ved uthus og hönsegjerde. Austlandet nord til Lom. Elles i kyst- og fjordbygder til Indre Sogn. Kristiansund. Oppdal. Buvik. Stjørna. Frosta. Bodø. Fauske. Steigen. Helgøy.

Kjennemerke: Ca. 50 cm høg, mjukhåra blad med stygg lukt. Grågul krone med langt kronrør og mjølknappar på lange trådar. Krukkeforma beger med stiv krage. Blomstrane sit i bladhjørna og stengelen luter litt i toppen.

R E V E B J Ö L L E (*Digitalis purpurea*) Maskeblomsterfamilien

Gifterne og verknad: Purpureaglykosid A og B. Hjartemedisin. Ved små mengder slår hjarta seinare ned større slagvolum. Ved større mengder stoppar det heilt.

Vekseplassar og utbreiing: Steinete stader og i lier. Kyst- og fjordstrok til Nord-Frøya og Verran. Leka. Inn til Åseral, Ullvik og Sondal. Odda.

Kjennemerke: Høg stengel med hangande klokkeforma purpurraude blomstrar i lang klase som vender til ei side. Rundtagga håra blad. Stengelen dunhåra oppe.

M Y R S N E L L E (*Equisetum palustre*) Snellefamilien

Gifterne og verknad: Alkaloidet equisitin eller palustrin som er ei nervegift som fører til nervøse symptom, lammingar og ustø gang hos hest ("sviva"), redusert matlyst og mjølkemengd hos ku. Finske forsök har vist at 2 g tørr myrsnelle pr. dyr og dag er nok til å redusere mjølke-

mengda. Forgiftninga er kronisk og fører oftast til døden. Etter opplysning frå Veterinærhøgskulen er det særleg i Nord-Noreg ein har hatt "kjerringrokkforgiftning" hos husdyr. Småfe og gris toler gifta mye betre enn hest og ku.

Vekseplassar og utbreiing: Myr og vass-sjuk fastmark. Nokså vanleg.

Kjennemerke: Nedste leddet på greinene mye kortare enn den tannkransen på stengelen dei går ut frå. Saftig grøn stengel som oftast er greina med ulike lange greiner som kan vere nest like tjukke som stengelen. Greinene hjå myrsnella er 5-6 kanta, medan dei er trekanta hos engsnelle og firkanta hos åkersnelle. Skogsnella har greina greiner og er lett å kjenne på det.

Tyning: Sprøyting med MCPA i eng og beite drep skota over jorda, men ikkje dei djuptliggjande krypande jordstenglane. I kornåker kjem myrsnella og andre snellearter så seint opp at dei unngår sprøytevæska. Sprøyting ned amitrol i stubbåkeren skulle derimot etter utanlandske oppgåver vere svært effektivt.

V O R T E M J Ö L K A R T E R (*Euphorbia spp.*) Vortemjölkfamilien

Gifterne og verknad: Planter med mjölkesaft som inneholder giftemnet euforbon som er ei blanding av to umetta alkoholar. Det er ei såkalla skarp gift som verkar etsande og irriterende på hud og slimhinner.

S V I M M I N G (*Lolium temulentum*) Grasfamilien

Giftemne og verknad: Frøet inneholder eit alkaloid temulin som ein trur blir laga av råtesoppen Alternaria tenius. Gifta verkar på sentralnervesystemet og fører til sterkt hovudverk, svimmelheit og üyresus med sterke kjensle av trøytteleik. Men det fører sjeldan til døden.

Vekseplassar og utbreiing: Åkerugras og på avfallslassar. Sjeldnare no enn før. Nord til Nord-Trøndelag.

E N G S O L E I E (*Ranunculus acris*) Soleiefamilien

Gifterne og verknad: Protoanemonin eller anemonekanfer som er flyktig og forsvinner ved tørking. Det er difor berre rå engsoleie som er giftig. I sveitsiske forsök med ensilering av soleierikt gras med melasse som tilsetjingsmiddel fekk ein heller ingen forgiftning. Men vi veit

ikkje korleis det stiller seg ved bruk av maursyre eller AIV-væske. Det er ei sokalla skarp gift som verkar etsande og irriterende på hud og slimhinner. I tørkesomrar har det hendt at mjølkekyr på beite har stroke med av soleieforgiftning. (Sjå elles side 49).

T I G G A R S O L E I E (*Ranunculus sceleratus*) Soleiefamilien

Giftenne og verknad: Det same som for engsoleie, men i mykje større mengd. Safta lagar sår og blærer på huda og blei brukt av tiggjarar for å skaffe seg større medkjensle.

Vekseplassar og utbreiing: Våte stader. Austlandet nord til Nes i Hedmark. Sør-Fron. Sel. Elles i kyststrok nord til Roan og Verdal. Dønnes.

Kjennemerke:- Eittårig, mangeblomstra med snaue riflete blomsterskaft. Gulgrøn greina stengel, litt håra øvst, gulgrøne begerblad og bleikgule kronblad, knapt 1 cm brei blomster.

D I K E S V I N E B L O M (*Senecio aquaticus*) Korgplantefamilien

Giftenne og verknad: Alkaloidet jacodin som fører til leverfibrose ("skrumplever") hos storfe og hest, men ikkje hos småfe og gris. Symptoma er redusert matlyst, avmagring, oppknepen buk, tørt og pjusket hårlag, blodig stinkande diaré, lite mjølk med vond emmen lukt ("Sira-sjuka"). Nervøse symptom hos hest. Forgiftninga er kronisk og fører oftast til døden.

Vekseplassar og utbreiing: Våt grasbakke. Nord-Vågsøy. Ulstein. Hareid. Ålesund. Borgund. Giske. Vigra. Haran. Sandøy. Molde. Kristiansund. Smøla. På avfallslassar kring Oslofjorden. Eidanger. Kragerø. Hisøy. Kristiansand. Fana. Tromsø. (Iflg. Rolv Langeland: Hovudoppgåve ved NLH 1966, er det berre på ytre Sunnmøre, frå Herøy i sør til Sandøy i nord, at dikesvineblom spelar noka økonomisk rolle).

L A N D Ö Y D A (*Senecio jacobaea*) Korgplantefamilien

Giftenne og verknad: Alkaloida jacodin, jacobin og senecionin. Verke-måten er stort sett den same som for dikesvineblom.

Vekseplassar og utbreiing: Beitemark og i småskog. Austlandet nord til Fåberg. Elles i kyststrok til Gloppen. Men det er berre i Rogaland og Hordaland at den spelar nokon økonomisk rolle. (Sjå og side 52).

Kjennemerke på dikesvineblom og landøyda: Plantene er nokså like å sjå til. Dei har gule korgblomstar og finna blad på stengelen, men dei kan skiljast på at dei nedre blada er heile hos dikesvineblom og finna hos landøyda. Dikesvineblomen har elles få store korger med berre snaue frø, medan landøyda har mange små korger i halvskjern og håra skivefrø.

S V A R T S Ö T V I E R (*Solanum nigrum*) Søtvierfamilien

Gifterne og verknad: Dei svarte bæra innehold eit nitrogenhaldig glykosid solanin som fører til oppkast, diaré og omtåka tilstand.

Vekseplassar og utbreiing: Sjå side 32.

S L Y N G S Ö T V I E R (*Solanum dulcamara*) Søtvierfamilien

Gifterne og verknad: Det same som for svartsøtvier.

Vekseplassar og utbreiing: I småskog mest ved bekker. Austlandet fra Haugesund til Fana og i indre Sogn. Trøndelag fra Orkdal til Inderøy og Snåsa.

Kjennemerke: Slyngsøtvier er ein busk med lange skot som kliv i tre og buskar. Den har fiolette blomstrar og rauder bær.

U G R A S L I S T E

Norske plantenamn etter Johs. Lid: NORSK OG SVENSK FLORA

Balderbrå	45	Jordrøyk	27
Blåkoll	49	Klengjemaure	28
Blåmelde	26	Klinte	80
Burot	50	Knappsev	76
Byhøy mole	53	Kornblom	37
Dikesvineblom	46, 84	Kornvalmue	40
Dunkjempe	51	Krokhals	20
Einstape	66	Krusetistel	44
Engkarse	50	Krushøy mole	53
Engmose	57	Krypsoleie	60
Engsoleie	49, 83	Kvassdå	28
Flikbrønsle	24	Kveke	62
Floghavre	21	Kvitbladtistel	64
Frømelde	26	Kvit gåseblom	36
Følblom	48	Landøyda	52, 84
Geiterams	68	Linbendel	33
Gjærtartaske	37	Lodnefaks	44
Giftkjeks	81	Lyssev	76
Grasstjerneblom	56	Løvetann	56
Groblad	51	Matsyre	76
Grønt hönsegras	31	Meldestokk	25
Guldå	28	Mjuktvitann	29
Gul gåseblom	50	Mjødurt	75
Gullkrage	26	Myrsnelle	82
Gulrot	45	Myrtistel	44
Gåsemure	60	Nyseryllik	60
Haredylle	33	Pengeurt	42
Haremat	39	Piggeple	81
Hestehov	66	Prestekrage	51
Hundekjeks	74	Raudmelde	26
Hundepersille	80	Raudt hönsegras	31
Høy mole	53		

Raudtvitann	38	Villrot	82
Rugfaks	44	Vindelslirekne	30
Russekål	53	Vinterkarse	52
Ryllik	60	Vårkål	73
Sandskrinneblom	36	Åkerdylle	71
Selsnepe	80	Åkergråurt	42
Skvallerkål	61	Åkergull	26
Slyngsötvier	85	Åkerkål	23
Smalkjempe	51	Åkerminneblom	40
Småengkall	32	Åkermynte	72
Smånesle	34	Åkerreddik	23
Småsyre	71	Åkersennep	23
Stemorsblom	43	Åkersnelle	64
Stivdylle	33	Åkerstemorsblom	34
Storengkall	32	Åkersvineblom	41
Stormaure	65	Åkersvinerot	73
Stornesle	67	Åkertistel	68
Svartsötvier	32, 85	Åkervindel	69
Svimling	83	Åkervortemjölk	27
Svinemelde	20		
Sølvbunke	48		
Takrøyrr	65		
Teinung.....	79		
Tiggarsoleie	84		
Tranehals	38		
Tunbalderbrå	29		
Tungras	30		
Tunrapp	40		
Tyrihjelm	74, 80		
Ugrasklokke	75		
Vanleg arve	38		
Vanleg hönsegras	31		
Vassarve	41		
Vegkarse	70		
Vegtistel	44		

U G R A S L I S T E

Latinske plantenamn etter Johs. Lid: NORSK OG SVENSK FLORA

Achillea millefolium	60	Chrysanthemum ségetum	26
Achillea ptarmica	60	Chrysanthemum leucanthemum	51
Aconitum septentrionale .74, 80		Cicuta virosa	80
Aegopodium podagraria	61	Cirsium arvense	68
Aethusa cynapium	80	Cirsium heterophyllum	64
Agropyron repens	62	Cirsium palustre	44
Agrostemma githago	80	Cirsium vulgare	44
Anchusa arvensis	20	Conium maculatum	81
Anthemis arvensis	36	Convolvulus arvensis	69
Anthemis tinctoria	50	Datura stramonium	81
Anthriscus silvestris	74	Daucus caróta	45
Artemisia vulgaris	50	Deschampsia caespitosa	48
Atriplex pátula	20	Digitalis purpurea	82
Avena fatua	21	Equisetum arvense	64
Barbarea vulgaris	52	Equisetum palustre	82
Bidens tripartita	24	Erodium cicutarium	38
Brassica campestris	23	Erysimum cheiranthoides	26
Bromus mollis	44	Euphorbia helioscopia	27, 83
Bromus secalinus	44	Filipendula ulmaria	75
Bunias orientalis	53	Fumaria officinalis	27
Campanula rapunculoides	75	Galeopsis speciosa	28
Capsella bursa-pastoris	37	Galeopsis tetrahit	28
Cardamine pratensis	50	Galium aparine	28
Cardaminopsis arenosa	36	Galium mollugo	65
Cardus crispus	44	Geranium pusillum	59
Centaurea cýanus	37	Gnaphalium uliginosum	29
Cerástium caespitósum	38	Hylocomium squarrosum	57
Chamaenerion angustifolium	68	Hyoscyamus niger	82
Chenopódium album	25	Juncus effusus	76
Chenopodium glaucum	26	Juncus conglomeratus	76
Chenopodium polyspermum	26		
Chenopodium rubrum	26		

<i>Lamium amplexicaule</i>	29	<i>Senecio aquaticus</i>	46, 84
<i>Lamium purpureum</i>	38	<i>Senecio jacobaea</i>	52, 84
<i>Lapsana communis</i>	39	<i>Senecio vulgaris</i>	41
<i>Leontodon autumnalis</i>	48	<i>Sinapis arvensis</i>	23
<i>Lolium temulentum</i>	83	<i>Solanum dulcamara</i>	85
<i>Matricaria inodora</i>	45	<i>Solanum nigrum</i>	32, 85
<i>Matricaria matricarioides</i> ..	29	<i>Sonchus arvensis</i>	71
<i>Mentha arvensis</i>	72	<i>Sonchus asper</i>	33
<i>Myosotis arvensis</i>	40	<i>Sonchus oleraceus</i>	33
<i>Papaver rhoeas</i>	40	<i>Spargula arvensis</i>	33
<i>Phragmites communis</i>	65	<i>Stachys palustris</i>	73
<i>Plantago lanceolata</i>	51	<i>Stellaria graminea</i>	56
<i>Plantago major</i>	51	<i>Stellaria media</i>	41
<i>Plantago media</i>	51	<i>Taraxacum officinale</i>	56
<i>Poa annua</i>	40	<i>Thlaspi arvense</i>	42
<i>Polygonum aviculare</i>	30	<i>Tussilago farfara</i>	66
<i>Polygonum convolvulus</i>	30	<i>Urtica dioica</i>	67
<i>Polygonum lapathifolium</i>	31	<i>Urtica urens</i>	34
<i>Polygonum persicaria</i>	31	<i>Viola arvensis</i>	34
<i>Polygonum tomentosum</i>	31	<i>Viola tricolor</i>	43
<i>Potentilla anserina</i>	60		
<i>Prunella vulgaris</i>	49		
<i>Pteridium aquilinum</i>	66		
<i>Ranunculus acris</i>	49, 83		
<i>Ranunculus ficaria</i>	73		
<i>Ranunculus repens</i>	60		
<i>Ranunculus sceleratus</i>	84		
<i>Raphanus raphanistrum</i>	23		
<i>Rhinanthus minor</i>	32		
<i>Rhinanthus major</i>	32		
<i>Rorippa silvestris</i>	70		
<i>Rumex acetosa</i>	76		
<i>Rumex acetosella</i>	71		
<i>Rumex crispus</i>	53		
<i>Rumex domesticus</i>	53		
<i>Rumex obtusifolius</i>	53		